

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

うがい薬 コロロSP

第2類
医薬品

うがい薬コロロSPは、口中やのどを殺菌・消毒して、口中をスッキリと洗浄します。また、口臭が気になるときにもどうぞ。

⚠ 使用上の注意



* してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の人は使用しないこと

- (1) 本剤又は本剤の成分、クロルヘキシジングルコン酸塩によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 口の中に傷やひどいただれのある人。



* 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状の名称
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
□	刺激感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

* (用法及び用量に関連する注意)

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) うがい用にのみ使用すること。
- (3) 定められた用法及び用量を守ること。
- (4) 本剤は使用する時にのみ希釈し、希釈後は早めに使用すること。

【成分及び分量】

本剤は、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩を0.1g、その他添加物としてℓ-メントール、ポリソルベート80、炭酸水素ナトリウム、エタノール、プロピレングリコール、香料、黄色5号、その他1成分を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器(専用の容器を除く)に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないこと。

【お問い合わせ先】

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

サラヤ株式会社 お客様相談窓口

TEL.06-6797-2525

*受付時間 9:00～18:00(土、日、祝日を除く)

【効能又は効果】 口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法及び用量】

[20mL・50mLの場合]

キャップ7分目の水に、本剤を5～7滴落とし(80～100倍にうすめて)、1日数回うがいをしてください。

[150mLの場合]

キャップ半分の水に、本剤を約10滴落とし(80～100倍にうすめて)、1日数回うがいをしてください。