

ご使用に際して、この添付文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。

速乾性手指消毒剤

ヒビスコール[®]S

第2類医薬品

クロルヘキシジングルコン酸塩を有効成分とする速乾性の手指消毒剤で、エタノール蒸発後も効果が持続します。
本剤は手荒れを防止する成分として湿潤剤を配合しています。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

次の部位には使用しないこと

- (1) 損傷のある皮膚。
- (2) 目の周囲、粘膜等。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (4) 血液や汚物等が付着している場合には、石けんでよく洗浄後、水分を除去してから使用すること。

【成分及び分量】

ヒビスコールSは、100mL中に有効成分としてクロルヘキシジングルコン酸塩を0.2g、溶剤としてエタノール、その他添加物としてアジピン酸ジイソブチル、アラントイン、ポリオキシエチレンヤシ油脂肪酸グリセリルを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器(専用の容器を除く)に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 取扱う場合、換気を十分行うこと。
- (5) 火気に近づけないこと。
- * (6) 使用期限が過ぎた製品は、使用しないこと。
- * (7) 本剤はアルコールを含有しているため、床などの塗装面や衣服などについたりすると変色する場合があるので注意すること。



火気厳禁

危険物第4類
アルコール類(エタノール)
水溶性・危険等級Ⅱ

【効能又は効果】手指の消毒

【用法及び用量】

適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。



① 手の平と手の平をこする



② 指を組んで両手の指の間をこする



③ 両指を曲げ 指の背と手の平をこする(両手)



④ 指先をもう片方の手の平でこする(両手)

〈用法及び用量に関連する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2) 目に入らないよう注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3) 外用にのみ使用すること。