

和漢薬製剤

腰 専 門

第2類医薬品

腰専門は、12種類の生薬を配合し、その成分が総合的に働いて腰痛をはじめ各種神経痛や関節痛等を和らげます。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、下痢

- (2) しばらく服用しても症状がよくなる場合

【成 分・分 量】1日量 (45丸) 中

ニンジン末・・・0.15g	トウキ末・・・0.3g	ヒシノミ末・・・0.2g
ジオウ末・・・0.3g	ジュウヤク末・・・0.3g	タクシャ末・・・0.2g
シンドウ末・・・0.3g	コケモモ葉末・・・0.3g	ドクカツ末・・・0.2g
センキュウ末・・・0.3g	ガジュツ末・・・0.25g	ニュウコウ末・・・0.2g

添加物として寒梅粉、炭酸Caを含有します。

*【効 能・効 果】

腰痛、血の道症、関節痛、神経痛、肩こり、手足の疼痛・しびれ感

*【用 法・用 量】

次の量を、1日3回食間に白湯又は水で服用して下さい。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
成人 (15才以上)	1 5 丸	3 回
8才以上15才未満	7 丸	
5才以上 8 才未満	5 丸	
5才未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を守って下さい。
- (2) 小児に服用させる場合は、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れかえないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わる場合があります。)
- (4) 期限をすぎた製品は、服用しないで下さい。

【お問い合わせ先】

天恵堂製薬株式会社「お客様相談窓口」電話 0952-97-0036

受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 **天恵堂製薬株式会社**

佐賀県佐賀市蓮池町蓮池234