

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください

第3類医薬品

うすめずそのまもうがいする
イソジン®うがい薬C

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。

相談すること ① 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) 口内のひどいだれのある人。(3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人。

② 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③ 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

くすり相談室 ☎ 0120-841-704
9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話:0120-149-931

製造番号(上)・使用期限(下)は
底面に記載

発売元 株式会社 明治
136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
製 造 Meiji Seika ファルマ株式会社
販売元 東京都中央区京橋 2-4-16
技術提携: ムンディファーマ B.V.

特徴

●口腔内殺菌消毒薬 ●清涼化剤 *l*-メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加物)配合。お口とのどに、すっきり清涼感強めのイソジンうがい薬です。

用法・用量

うすめずにそのまま適量(約15～20mL)を口に含んで、2～3回うがいをする。これを1日数回行う。

【用法・用量に関連する注意】 (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2) 本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないこと。(3) 目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4) 定められた用法、用量を厳守すること。

効能・効果

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

成分・分量

1mL中 ポビドンヨード 3.5mg
(有効ヨウ素として 0.35mg)

●添加物: エタノール、グリセリン、*l*-メントール、サッカリンNa、pH調整剤、香料、インプロパノール、その他1成分

【成分・分量に関連する注意】

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3) 他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わることがある。)(4) 衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。(5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。



- キャップの内側に目盛りがついています。
- 内容液は茶色です。
- 本剤は、うがい以外に使用しないでください。



ボトル: PET
キャップ: PP
ラベル: PS
外装フィルム: PE
A-ADDCM

