



2013年8月 記載要領変更に伴う改訂

第3類  
医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミンB<sub>1</sub>主薬製剤  
ひざ・腰・肩 関節の痛みに

# ビタミン<sup>®</sup>ネンアクティブ

ビタミンネンアクティブは…

- 神経細胞機能を維持し、神経を円滑に働かせるベンフォチアミン(ビタミンB<sub>1</sub>誘導体)と軟骨成分を形成及び修復する働きがあるコンドロイチン硫酸エステルナトリウムが関節痛、神経痛、腰痛、五十肩などに効果をあらわします。
- 体内でのエネルギー産生に重要な成分として働くアスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物を配合しています。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振



2. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください  
軟便、下痢
3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

### [効 能]

- 次の諸症状の緩和：  
筋肉痛・関節痛(腰痛、肩こり、五十肩など)、神経痛、手足のしびれ、眼精疲労、便秘
- 脚気  
「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」
- 次の場合のビタミンB<sub>1</sub>の補給：  
肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

## 〔用法・用量〕

下記の1回服用量を服用します。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	3錠	2～3回
15才未満	服用しないでください	

ただし、1日2回服用する場合は朝晩、1日3回服用する場合は朝昼晩服用します。

## 〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

## 〔成分・分量と働き〕9錠中

成 分	分 量	働 き
ベンフォチアミン (ビタミンB <sub>1</sub> 誘導体)	90mg	神経細胞の機能を維持して、神経を円滑に働かせ、腰痛、肩こり、眼精疲労に効果をあらわします。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	600mg	軟骨組織中に存在し、弾力性や保水性を与える役割をしています。軟骨成分の形成及び修復する働きがある為、関節痛・筋肉痛などの緩和に役立ちます。
アスパラギン酸カリウム・ マグネシウム等量混合物	300mg	体内でのエネルギー産生に重要な成分として働き、ビタミンB <sub>1</sub> の働きを助けます。

添加物として、塩酸グルコサミン、クエン酸Ca、ショウキョウ、CMC、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、ヒプロメロース、マクロゴール、酸化チタン、三二酸化鉄、リボフラビンリン酸エステルNaを含有します。

## ◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



## このような症状の方に…

- 階段の昇り降りがづらい方
- 立ったり座ったりがづらい方
- 重い荷物を持ち上げて腰を痛めたことがある方
- スポーツや立ち仕事で関節を酷使している方
- 正座すると痛みやこわばりを感じる方
- 五十肩など肩の痛みを感じる方



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせください。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号