

整腸生菌と植物繊維配合の便秘薬

サトラックス® ビオファイブ

サトラックスビオファイブは…

- 植物センイを多く含むブランタゴ・オバタ種子を配合し腸内で膨潤することにより、自然に近いお通じを誘う植物性の便秘薬です。
- ラクトミン（乳酸菌）と糖化菌が腸内で有用菌として働き、便秘や便秘に伴う諸症状の緩和を助けます。
- 服用しやすいココア風味で小粒の顆粒剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

- （守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）
1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の瀉下薬（下剤）
 2. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
 3. 大量に服用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
 (1) 医師の治療を受けている人。
 (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 (5) 次の症状のある人。
 はげしい腹痛、悪心・嘔吐
 2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
 (1) 服用後、次の症状があらわれた場合
- | 関係部位 | 症状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
| 消化器 | はげしい腹痛、悪心・嘔吐 |
- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください
下痢



【効 能】

- 便秘
- 便秘に伴う次の諸症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常發酵、痔

【用法・用量】

下記の1回服用量をなるべく空腹時にコップ一杯の水又は白湯でかまずに服用します。服用間隔は4時間以上おいてください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
成人（15才以上）	1～2包	2回を限度とします
15才未満	服用しないでください	

ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら少しずつ増加又は減量してください。

【用法・用量に関連する注意】

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 1日最大4包までを限度として服用してください。

【成分・分量と働き】4包（12g）中

成 分	分 量	働 き
ブランタゴ・オバタ種子末	8,672mg	腸内で水分を吸収して容積を増やし、適度な硬さの便をつくります。また、腸のぜん動運動を促して自然に近いお通じを誘います。
センナ実末	1,984mg	腸のぜん動運動を高めお通じを促します。
ニコチン酸アミド	5mg	乳酸菌の生育を助けるビタミンです。
糖化菌	100mg	腸内で有用菌として働き、便秘や便秘に伴う諸症状の緩和を助けます。
ラクトミン（乳酸菌）	60mg	

添加物として、エリスリトール、ヒドロキシプロピルセルロース、カカオ末、アスコルビン酸、三酸化鉄、アスパルテーム（L-フェニルアラニン化合物）、無水ケイ酸、香料、エチルパニリン、パニリン、デンプン部分加水分解物、プロピレングリコールを含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎ご使用に際してのアドバイス

- 便秘薬の有効量は個人差がありますので、便通の具合をみて、1回1～2包を1日1～2回の範囲で増減してください。
- かならずコップ一杯（約180mL）の水又は白湯でかまずに服用してください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
 佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
 電話 03(5412)7393
 受付時間:9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

製造販売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号