



sato

セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

2013年3月 記載要領変更に伴う改訂

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



乗物酔い薬

エアミット®

エアミットは…

- 11才のお子様からのめる甘い乾式糖衣錠です。
- 作用時間の比較的短いジメンヒドリナート配合で、効果が持続しすぎて旅先でふらついたり、ボーッとしたりすることが比較的少なくなっています。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)

2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)

3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 高齢者。
- (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

排尿困難

- (6) 次の診断を受けた人。

緑内障、心臓病



2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
精神神経系	頭痛
泌 尿 器	排尿困難
そ の 他	顔のほてり、異常なまぶしさ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

口のかき、便秘、眠気、目のかすみ

【効 能】

乗物酔いによるめまい・吐き気・頭痛の予防及び緩和

【用法・用量】

乗物酔いの予防には乗車船30分から1時間前に、下記の1回服用量を服用します。なお、乗物酔いの症状が起こった時に追加服用する場合には同量を4時間以上の間隔において服用してください。

年 齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	3回を限度とします
11～14才	1錠	
11才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量と働き】2錠中

成 分	分 量	働 き
ジメンヒドリナート	50mg	酔い止め効果をあらわします。
スコポラミン 臭化水素酸塩水和物	150 μ g	はきけやめまいなど、乗物酔いの症状を抑えます。
無水カフェイン	40mg	乗物酔いによる頭痛を軽減します。

添加物として、リン酸水素Ca、CMC、乳糖、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸Mg、タルク、黄色5号、白糖、D-マンニトール、セルロース、マクロゴール、ポビドン含有します。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



◎乗物に酔わないためのアドバイス

1. 睡眠は十分にとっておきましょう。
2. 食事は軽めに、食べすぎや極度の空腹はさけましょう。
3. 胃腸の調子を整え、特に便秘をしないようにしましょう。
4. 服装はゆったりとしたものにしましょう。
5. 乗物の窓から遠くの景色をながめるようにしたり、他の人と楽しく話をするようにしましょう。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元(輸入)
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号
MANUFACTURED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. TAIWAN
IMPORTED & DISTRIBUTED BY
SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD. JAPAN
MADE IN TAIWAN.