

すり傷・きり傷に
色のつかない
殺菌・消毒液

■使用上の注意 [相談すること]

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 患部が広範囲の人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、本品を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

(2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

■効能

すり傷、きり傷、かき傷、靴ずれ、手指の殺菌・消毒

■成分・分量

10w/v% 塩化ベンザルコニウム液1v/v%
塩酸フェニレフリン0.05w/v%
リドカイン1w/v%

添加物として、塩化Na、クエン酸Na、アルコール、pH調整剤、香料、メントール、チモールを含有します。

■用法・用量

患部に適量を塗布又は噴霧します。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

この商品のお問い合わせは、電話
03-5412-7393までお願い致します。

製造販売元

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

(H)

★本品には添付文書はありません。容器の記載文を代用しています。