



2013年2月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

外用痔疾用薬 ジーフォーL 注入軟膏

プレドニゾロン酢酸エステル配合

ジーフォーL注入軟膏は…

- 患部のかゆみやはれ・出血を抑えるプレドニゾロン酢酸エステルを配合しています。
- 手を汚さず、直接患部に塗布及び注入できます。



使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は使用しないでください
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 患部が化膿している人。
2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
そ の 他	刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効 能〕

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血の緩和

〔用法・用量〕

〈肛門内に注入する場合〉

ノズル部分を肛門内に挿入し、全量をゆっくり注入してください。

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人（15才以上）	1個	1～2回
15才未満	使用しないでください	

〈肛門部に塗布する場合〉

次の量を肛門部に塗布してください。なお、一度塗布に使用したものは、注入には使用しないでください。

年 齢	1回使用量	1日使用回数
成人（15才以上）	適量	1～3回
15才未満	使用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児には使用させないでください。
- (3) 肛門部にのみ使用してください。

〔注入する場合〕




① キャップを取りボディを押し軟膏を少し先端部に出します。



② ノズルを肛門内に挿入しボディを押し、ゆっくり注入して押し込ままで引きぬいてください。

※ 全量を1回で注入してください。

〔塗布する場合〕



キャップを取り、軟膏をそのまま肛門部に塗布してください。

〔成分・分量と働き〕 1個（2g）中

成 分	分 量	働 き
プレドニゾン酢酸エステル	1mg	患部のかゆみやはれを抑えます。
リドカイン	60mg	患部の痛みやかゆみを抑えます。
アラントイン	20mg	粘膜の修復を助けます。
トコフェロール酢酸エステル	50mg	血行を促進し、患部のうっ血（血がとどこおること）を改善し、効果をあらわします。

添加物として、流動パラフィン、モノステアリン酸グリセリン、縮合リシノレイン酸ポリグリセリル、白色ワセリンを含有します。

●保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。）
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。
- (5) 使用済みの容器はトイレに流さないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931（フリーダイヤル）

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお問い合わせをお願いします。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412) 7393
受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）