

2013年3月 記載要領変更に伴う改訂

第3類医薬品

歯肉炎・歯槽膿漏薬
口臭、歯ぐきの腫れに

アセス液®

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



アセス液は…

- 口臭や歯肉の炎症を起こす細菌にすぐれた抗菌力をあらわします。
- 歯ぐきのはれや出血などの症状にすぐれた効果をあらわします。
- さわやかな味の医薬品のマウスウォッシュです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
 - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3) 次の症状のある人。
ひどい口内のただれ
 - 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
- | 関係部位 | 症 状 |
|------|-----------|
| 皮 膚 | 発疹・発赤、かゆみ |
- 使用後、症状が悪化した場合は、使用を中止し、この文書を持って、医師、薬剤師、又は、登録販売者にご相談ください
 - しばらく使用しても症状がよくなりません場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

【効 能】


歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状(口臭・口のねばり・歯ぐきのむずがゆさ・はれ・発赤・歯ぐきからのうみ・出血)の緩和

【用法・用量】

1日2回(朝・夕)歯肉をブラッシングした後、本剤1mL を水で15倍に薄めて、歯肉部分を中心に約30秒間激しく口をすすぎます。

【用法・用量に関連する注意】

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 歯科用のみ使用してください。
- (4) 洗口した後、飲み込まずに吐き出し、そのままか、あるいは水でゆすいでください。



〔成分・分量と働き〕

成 分	分 量	働 き	
カミツレチンキ	1.25%	ヨーロッパ原産の越年草、カミツレの花から抽出したもので、主成分のカマスレン、アズレン等は抗炎症作用、抗菌作用等をもち、歯ぐきのはれや発赤、化膿等に効果があります。	
ラタニアチンキ	1.25%	南米原産のラタニアの根から抽出したものでタンニン、ラタニン等の成分を含有し、抗菌作用、止血作用や歯ぐきをひきしめる効果があります。	
ミルラチンキ	0.62%	アフリカ東北部に産するミルラの樹液より抽出したもので、フェノール性樹脂や樹脂酸等の成分を含有し、はれをとる作用があります。	

添加物として、薬用石ケン、プロピレングリコール、ハッカ油、パラベン、香料を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤は、天然の生薬を用いた製剤ですので、製品により、色、味が多少異なる場合がありますが、効果には変わりありません。

口臭の多くは、口の中の細菌（ジンジバリス菌）が歯垢を分解してガスを発生することで起こります。ジンジバリス菌はさらに、毒素を出して歯ぐきのはれや炎症を引き起こします。アセス液は、天然の植物性生薬の働きでジンジバリス菌にすぐれた抗菌力をあらわします。さらに、すぐれた抗炎症作用、はれを鎮める作用等により、歯槽膿漏の諸症状に効果をあらわします。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



◎歯と歯ぐきの健康のためのアドバイス

1. 毎食後に必ず歯をみがく習慣をつけ、口内を清潔にしましょう。
2. 正しいみがき方でいねいに歯をみがき、歯ぐきをマッサージしましょう。
3. 定期的に歯科医院で歯石を除去し、歯と歯ぐきの健康診断を受けましょう。
4. 甘いものや間食はさけましょう。
5. 新鮮な野菜や果物、小魚などをとり、ビタミンやカルシウムの補給に心がけましょう。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独) 医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの
 お店又は下記にお願い申し上げます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
 電話 03(5412)7393
 受付時間：9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
 東京都港区元赤坂1丁目5番27号
 提 携
マダウス社 <ドイツ>