

ご使用に際して、この説明文をお読み顶かなければなりません。必ずお読みの上より大切に保管してください。

第2類医薬品

■ 薬名表示 ■ サロメチールIDパップE 6粒入 (14cm)×(10cm)

サロメチールIDパップEの特長:

- 1.インデメタシン、ビタ... - 消炎鎮痛効果にすぐれたインデメタシンにビタミンE、グリチルレチ... (甘草トコフェロール)、グリチルレチン酸を配合。
2.抗酸化... - ビタミンEなどにビタミンE配合。
3.保湿効果... - 保湿効果をもたらす効果をもたらします。
4.保護アスター剤... - 保護アスター剤つづいて、パップEの保護効果をもたらします。

▲ 使用上の注意

▣ してはいけないこと

(守らなければ現れる症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は使用しないでください

- (1)本剤による過敏症例(例えば発熱・発赤、はれ、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
(2)ぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。

2.次の部位には使用しないでください

- (1)眼の周囲、粘膜等。(2)皮膚、かぶれ、傷口。
(3)あくまでしめたる等又は化膿している部位。

3.連続して2週間以上使用しないでください。

■ 相談すること

1.次の人は使用前に医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)頭部の治療を受けている人。
(2)既往歴又は経緯していると思われる人。
(3)本人又は家族がアレルギー体質の人。
(4)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.次の場合は、重複する副作用を中止し、専門医に持つて医師又は薬剤師にご相談ください

- (1)服用後、次の症状が悪化された場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発赤・発熱・かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、刺感、乾燥感

- (2)5～6回間使用しても症状がよくならない場合

(3)他の薬、健康、既往歴、関節痛、打撲、腫れに伴う風の痛み、腰痛或いは手・手首の痛み、肘の痛み(アニス財等)

(成分・量と量感) 薬量100g中(1枚)は薬量14g

成 分	分 量	用 途
インデメタシン	0.5g	消炎鎮痛作用にすぐれ、筋肉痛、關節痛にすぐれた効果をもたらします。
甘草トコフェロール	0.3g	血行をよくし、炎症を助けます。
グリチルレチン酸	0.05g	インデメタシンの筋肉痛作用を助けます。

保湿効果として、カオリナ、酸化チタン、ポリビニルアルコール(界面活性剤)を含め、ポリアクリル酸銀分岐物、カルボキシビニルポリマー、CMC-Na、ローランヒートム、グリセリン、エチル酸銀、タバコアルコール、タブ酸アルミニウム、ポリオキシエチレン酸化ヒマツ油、トメントールを含有します。

(乳液・用量) プラスチックフィルムをはがし、1日2回を標準として局部に貼付してください。

(用途・用量に問題がある場合)

(1)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやは

れの他の症状の治療をする薬剤ですので、症状がある場合は使用してください。(2)貼られた部位・用量をお守りください。

(3)汗をかいたり、局部が濡れている時は、よく拭きとてから使用してください。

(4)皮膚の弱い人は、使用前に薬の内側の皮膚の弱い部位に、1～2cm角の小片を置きとて汗をかく上記の用途・用量を守りください。

(5)保湿効果の上(注意)

(1)直射日光のかたらぬ、温湯のか少し涼しい間に保管してください。

(2)小袋の手の届かない所に保管してください。

(3)他の容器に入れる替えがないでください。(誤服の原因になったり品質が変わるものがあります。)

(4)保管場所のため、本剤用分離袋に入れ、開口部のファスターを開めて保管してください。

(5)使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。

本剤についてのお問い合わせは、お問い合わせの内容は下記にお問い合わせ下さい。

新潟製薬株式会社 お香薬局販売部 電話 03(5412)7383

受付時間 9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

新潟製 薬 塗 様 式 有 限 公 司 新潟県新潟市東区新潟市下島町16番2号

新潟県薬業審査委員会に登録してあります。

(社)新潟製薬株式会社

<http://www.nippon-pharm.co.jp/kanseigou/index.html>

0120-149-611(フリーコール)



新潟製薬株式会社
新潟県新潟市東区新潟市下島町16番2号
TEL 0120-149-611(フリーコール)



4 987316 093734