

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

目薬

なみだロートドライアイコンタクトa 第3類医薬品

レンズ装用時の目の乾きには…

なみだロート ドライアイコンタクト

目の乾き・
疲れに

13mL

コンタクトも
うるおい実感。

すべての
コンタクト
対応

コンタクトレンズ装用中に涙が不足すると、レンズのはりつきやこすれなどが生じ、不快を感じたり、角膜を傷つけてしまうことがあります。

「なみだロートドライアイコンタクトa」は、角膜保護成分を最大濃度配合した、とろりとした製剤が瞳とレンズを包み込むため、レンズ装用中の乾きに効果的です。



製品特長

- ◆ 不足した潤い(涙)を補給
- ◆ すべてのコンタクトレンズに対応
- ◆ 角膜保護成分最大濃度配合:コンドロイチン硫酸エステルナトリウム
※一般用眼科用薬製造承認基準の最大濃度配合
- ◆ 瞳とレンズを包み込むような、とろりとしたさし心地:
ヒアルロン酸Na配合(製剤の粘稠剤)



18世紀に、日本の医学の振興を目指して翻訳された“解体新書”。その開拓の思想のもとに、ロートは現代人の目の疾患をあらゆる方向から見つめ直しています。現在までに培ってきたノウハウと最新技術で酷使される目に応えたい、その想いを「解眼新書」の文字に託しました。

解眼新書ホームページ <http://www.rclub2.rohto.co.jp/kaigan/>

いつでも、どこでも、スムーズに点眼できる
フリーアングルノズル®



簡単にアイケアできて、とっても便利です。

ワンタッチ式スクリューキャップ



開ける時は左に1回カチッと回し、閉める時も右に1回カチッと回すだけ。簡単便利です。

使用上の注意

相談すること



1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 次の症状のある人
 ・ はげしい目の痛み
- (4) 次の診断を受けた人
 ・ 緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. この場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 目のかすみが改善されない場合
- (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1回1~2滴、1日5~6回点眼してください。

用法・用量に関する注意

(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(2) 容器の先を目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください。

〔汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因となる〕

また、混濁したものは使用しないでください。



(3) 点眼用にのみ使用してください。

(4) コンタクトレンズを装着していない時でも使用できます。

成 分

コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)0.5% ヒプロメロース0.4% ブドウ糖0.03% 塩化カリウム0.028% 塩化ナトリウム0.35% 炭酸水素ナトリウム0.05%

添加物として、ヒアルロン酸Na、ホウ酸、ホウ砂、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、ポリソルベート80、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、塩酸ポリヘキサニド、pH調節剤を含有します。

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。品質を保持するため、自動車内や暖房器具の近くなど、高温の場所(40°C以上)に放置しないでください。



(2) キャップを閉める際は、カチッとするまで回して閉めてください。

(3) 小児の手の届かない所に保管してください。

(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(5) 他の人と共用しないでください。

(6) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。



(7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとてご使用ください。

(8) 容器に他の物を入れて使用しないでください。

※潤いを持続させるため、薬液に粘性をもたせております。そのため、点眼後、しばらく視野がぼやけることがありますのでご注意ください。

お問い合わせ先：お客様安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)