

使用に当たって、この説明文書を必ず読むこと。
また、必要なときに読めるよう大切に保存すること。

タイワクムメルシエキ。®

イオウ・dl-カンフル含有ローション



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 患部が広範囲の人。
- (4) 湿潤やただれのひどい人。
- (5) 深い傷やひどいやけどの人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

にきび、ふきでもの

【用法及び用量】

1日数回、振り混ぜてから、手のひらで患部に塗擦する。場合によっては、昼間は上澄液だけを塗り、就寝前に振り混ぜてから塗擦する。

◎用法及び用量に関する注意

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3)外用にのみ使用すること。
- (4)定められた用法及び用量を厳守すること。
- (5)患部やその周囲が汚れたまま使用しないこと。
- (6)とくに皮ふの弱い人や皮ふが過敏な人は、腕の内側などに少量を塗布して翌日異常のないことを確かめてから使用すること。

【成分及び分量】

(100mℓ中)

イオウ 5.0 g dl-カンフル 0.3 g
ホモスルファミン 0.3 g

添加物として安息香酸ナトリウム、エタノール、香料、安息香酸ベンジル、ベンジルアルコール、dl-α-トコフェロール、グリセリン、アラビアゴム、石灰水を含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

消費者相談窓口

大和製薬株式会社

所在地 富山県富山市水橋二杉1-2

T E L 076(478)5171

受付日時 月～金曜日 AM10:00～PM3:00
(祝・祭日を除く)

製造販売元



大和製薬株式会社
富山県富山市水橋二杉1-2