

販売名：アンメルツヨコヨコNEO
External Anti-Inflammatory/Analgesic

⚠️ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないこと (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (2) ぜんそくを起こしたことがある人 (3) 妊婦又は妊娠していると思われる人 (4) 15才未満の小児
2. 次の部位には使用しないこと (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 皮膚の弱い部位(顔、頭、わきの下等) (3) 湿疹、かぶれ、傷口 (4) ずむし、たむし等又は化膿している患部
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎剤を使用しない
4. 長期運用しないこと

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること (1) 医師の治療を受けている人 (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (3) 次の医薬品の投与を受けている人：ニューキノロン系抗菌剤
2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み、刺激感、熱感、皮膚のあれ、落屑(フケ、アカ)のような皮ふのはがれ、水疱、色素沈着

まれに下記の重篤な症状が起こることがある場合は直ちに医師の診療を受けること

症状の名称	症状
ショック アナフィ ラキシ	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる
接触皮膚 炎、光線 過敏症	塗布部に強いかゆみを伴う発疹・発赤、はれ、刺激感、水疱・ただれ等の激しい皮膚炎症状や色素沈着、白斑があらわれ、中には発疹・発赤、かゆみ等の症状が全身にひろがることがある。また、日光があつた部位に症状があらわれたり、悪化することがある

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

—【成分・分量】100g中—

ジクロフェナクナトリウム 1g、
メントール 5g、トコフェロール酢
酸エステル 0.1g、ノナン酸パ
ニリルアミド 12mg、ニコチン酸
ベンジルエステル 10mg
添加物として、グリチルリチン酸、ミ
リスチン酸イソプロピル、プロピレ
ングリコール、ジプロピレングリ
コール、乳酸、エタノールを含有する

—【用法・用量】—

1日3～4回適量を患部に塗布して
ください。ただし、塗布部位を
ラップフィルム等の通気性の悪い
もので覆わないこと。なお、本
成分を含む他の外用剤を併用し
ないでください

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守する
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因となつている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用する
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しない
- (4) 1週間あたり50gを超えて使用しない
- (5) 目に入らぬように注意する
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗う。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受ける
- (6) 使用部位に他の外用剤を併用しない
- (7) 通気性の悪いもの(ラップフィルム、矯正ベルト等)で使用部位を覆い、密封状態にしない
- 皮膚の特に弱い方には、同じ所に続けて使用しない
- スポーツや入浴等、汗をかき前・後に使用した場合、ヒリヒリとした刺激、痛みや熱感が増すことがあります。これらの症状が強い場合は、石けんで洗い流すと緩和します

使用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要なときに読めるよう大切に保管してください

—【効能・効果】—

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所(冷暗所)にキャップをしかりしめて箱に入れて立てて保管すること
- (2) 火気に近づけないこと
- (3) 小児の手の届かない所に保管すること
- (4) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になつたり品質が変わる)
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく速やかに使用すること
- キャップをしかりしめないとき液がもれることがある
- 衣類に付着した場合には、各衣類の洗濯表示に従つて、すみやかに洗うこと

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお問い合わせいただけます

あつたらしいな/をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社
〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00～17:00(土・日・祝日を除く)

製造販売元 小林製薬株式会社
〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

税 控除 対象

火気厳禁 第一石油類 危険等級Ⅱ
エタノール含有物