

meiji

のどの  
殺菌・消毒  
口臭除去に

うがい以外に使用しないでください

計量カップの使い方

# 明治 うがい薬

細菌・真菌から  
**ウイルス**まで  
殺菌・消毒



©/Meiji

計量カップ付

第3類医薬品

いつものカバくんと  
「うがい」をしよう!



ず〜っと変わらない味。  
明治うがい薬

正しい濃度にうすめたうがい液  
約60mLを3度に分けてうがいする

## 1度目のうがい

食べかすや、口の中の有機物  
を取るため口に含み比  
較的強くうがいする



## 2度目のうがい

上を向いて、のどの奥まで  
うがい液が届くように15秒  
程度うがいする



## 3度目のうがい

2度目と同様、うがい液が口  
の中からのどに十分に届く  
ように15秒程度うがいする



計量カップを傾けて  
2と4の目盛りの間ま  
でうがい薬を入れる



カップを水平に  
もどして、60の  
線まで水を入れ  
て、うすめる

副作用被害救済制度  
電話: 0120-149-931

第3類医薬品

押して  
あける

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう、この箱は保存しておいてください。

### Ⅰ 使用上の注意

**してはいけないこと** (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。

**相談すること** ①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)口内のひどいただれのある人。(3)甲状腺機能障害の診断を受けた人。②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

| 関係部位 | 症 状            |
|------|----------------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ      |
| 口    | あれ、しみる、灼熱感、刺激感 |
| 消化器  | 吐き気            |
| その他  | 不快感            |

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

| 症状の名称                  | 症 状                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ショック<br>(アナフィ<br>ラキシー) | 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。 |

③5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

明治うがい薬

第3類医薬品

**成分・分量** 1mL中

ポビドンヨード 70mg (有効ヨウ素として 7mg)  
●添加物として、エタノール、l-メントール、サッカリンNa、香料を含有します。

**【成分・分量に関連する注意】** 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

**効能・効果**

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

**用法・用量**

1回、本剤 2～4mL を水約 60mL にうすめて、1日数回うがいしてください。

**【用法・用量に関連する注意】** (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないこと。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)本剤は使用する時にうすめて、早めに使用すること。(5)定められた用法、用量を厳守すること。

### 保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わることがある)。(4)衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

発売元

株式会社 明治 136-8308 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元

健栄製薬株式会社 大阪府中央区伏見町2丁目5番8号

製品情報問合せ先: くすり相談室 0120-841-704  
東京都中央区京橋2-4-16 (Meiji Seika ファルマ株)  
9時～17時 (土、日、祝日を除く)