

押して
あける

ご使用に際して、この箱の説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう、この箱は保存しておいてください。

Ⅰ. 使用上の注意

してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人は使用しないこと。

相談すること ①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)口内のひどいただれのある人。(3)甲状腺機能障害の診断を受けた人。②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③5~6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

明治うがい薬P

第3類医薬品

特徴 明治うがい薬の効きめはそのまま、ほんのりフルーティーな香りのうがい薬です。

成分・分量 1mL中
ポビドンヨード 70mg (有効ヨウ素として 7mg)
●添加物として、エタノール、L-メントール、クエン酸、リン酸水素Na、サッカリンNa、pH調整剤、香料、ベンジルアルコール、バニリン、安息香酸ベンジルを含有します。

【成分・分量に関連する注意】 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがある。

【効能・効果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用法・用量】

1回、本剤 2~4mLを水約 60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。

【用法・用量に関連する注意】 (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないこと。(3)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(4)本剤は使用する時にうすめて、早めに使用すること。(5)定められた用法、用量を厳守すること。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わることがある)。(4)衣服等に付着すると着色するので注意すること。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落とすこと。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

発売元

株式会社 明治 136-8906 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元

健栄製薬株式会社 大阪市中央区伏見町2丁目5番8号

製品情報問合せ先: くすり相談室 0120-841-704
東京都中央区京橋2-4-16 (Meiji Seika ファルマ 株)
9時~17時 (土、日、祝日を除く)

うがい以外に使用しないでください

計量カップの使い方

いつものカバくんと「うがい」をしよう!



ず〜っと変わらない味。
明治うがい薬P

正しい濃度にうすめたうがい液
約60mLを3度に分けてうがいのする

1 度目のうがい

食べかすや、口の中の有機物を取るため口に含み比較的強くうがいのする



2 度目のうがい

上を向いて、のどの奥までうがい液が届くように15秒程度うがいのする



3 度目のうがい

2度目と同様、うがい液が口の中からのどに十分に届くように15秒程度うがいのする



計量カップを傾けて2と4の目盛りの間までうがい薬を入れる



カップを水平にもどして、60の線まで水を入れて、うすめる

副作用被害救済制度
電話: 0120-149-931

第3類医薬品