

この説明文書は使用前に必ずお読みください。

イソジン®うがい薬C 第3類医薬品

特徴 清涼化剤(メントール(添加物)と、すっきり感をアップさせる香料(添加物)配合。お口とのどに、すっきり清涼感強めのイソジンうがい薬です。

△ 使用上の注意

【してはいけないこと】 ☒ (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなります) 次の人は使用しないでください 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状をおこしたことがある人

【相談すること】 ■ 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください (1) 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人 (2) 口内のひどいただれのある人 (3) 甲状腺機能障害の診断を受けた人
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

まれに下記の重篤な症状がおこることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁などがあらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この容器を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください

お問い合わせ 大阪 06-6209-6948
窓口 東京 03-3406-8450
受付時間9時～17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931

【販売元】
シオノギヘルスケア株式会社
大阪府中央区北浜2丁目6番18号

【製造販売元】
ムンディファーマ株式会社
東京都港区港南2-15-1

効能・効果 口腔内およびのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

用法・用量 うすめずにそのまま適量(約15～20mL)を口に含んで、2～3回うがいをする。これを1日数回行ってください。

【用法・用量に関連する注意】 ●定められた用法・用量を厳守してください。●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。●**本剤はうがいのみに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。**●目に入らないようにご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

成分・分量 1mL中 ポビドンヨード3.5mg(有効ヨウ素として0.35mg) 添加物として エタノール、フラゼリン、メントール、サッカリンナトリウム、pH調整剤、香料、その他1成分を含有しています。

【成分・分量に関連する注意】 本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯など)が変色することがあります。

保管および取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変化します。)(4) 衣服などに付着すると着色しますのでご注意ください。なお、付着した場合にすぐに水でよく洗い落としてください。(5) 使用期限をすぎた製品は、使用しないでください。



- キャップの内側に目盛りがついています。
- 内溶液は茶色です。
- 本剤は、うがい以外に使用しないでください。

製造番号、使用期限は底面に記載しています。

この製品は外側に透明フィルムでラッピングしています。



ボトル: PET
キャップ: PP
ラベル: PS
外装フィルム: PE

MADE IN JAPAN

A31E1 A02-0 ©:「イソジン」はムンディファーマの登録商標です。

