

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

きりきず・すりきず、とびひ・おできの殺菌・消毒に

meiji

外用殺菌消毒薬

第3類医薬品

イソジン[®]きず薬



- イソジンきず薬はポビドンヨードを有効成分とする殺菌消毒薬で、きり傷・すりむき傷・やけどなどの患部の殺菌・消毒、とびひ・おできなどの感染皮膚面の殺菌・消毒にすぐれた効果を発揮します。

■特徴

- 1.有効成分ポビドンヨードが、ヨウ素を遊離し、各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対して迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- 2.刺激性が弱く、皮膚の殺菌・消毒に適しています。
- 3.イソジンの色は、消毒範囲を示し、塗り残しを防げます。また、衣服についたものは、水で容易に洗い落とせます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



相談すること

- ①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)患部が広範囲の人。
 - (4)深い傷やひどいやけどの人。
- ②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

- ③5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

成分・分量 1 mL中 ポビドンヨード100mg(有効ヨウ素として10mg)

●添加物として、グリセリン、クエン酸、リン酸水素2Na、ラウロマクロゴール、pH調整剤を含有します。

効能・効果

きり傷、さし傷、すりむき傷、靴ずれ、やけど等の患部の殺菌・消毒
とびひ、おでき等の感染皮膚面の殺菌・消毒

用法・用量

1 日数回患部に塗布してください。

【用法・用量に関連する注意】

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3)本剤は外用だけに使用し、内服、うがいや粘膜の殺菌・消毒には使用しないでください。
- (4)石けん等との併用は本剤の殺菌・消毒作用を弱めることがありますので石けん分を洗い落としてから使用してください。
- (5)定められた用法、用量を厳守してください。

上手なキズのお手当

- 1.お手当の前に石けんで手をよく洗いましょう。
 - 2.きず口に泥や砂などの異物があれば流水で洗い流しましょう。
 - 3.清潔な綿球などにイソジンきず薬を十分にしみこませ、中心部より外に向かって広めに塗布し、そのまま乾かしてください。
- ※救急バンなどできず口を保護する場合は、イソジンきず薬が乾いてから、おおってください。



保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)衣服等に付着すると着色しますので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落としてください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

<製品情報問い合わせ先>

Meiji Seika ファルマ株式会社 くすり相談室 ☎ 0120-841-704
受付時間：9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

<副作用被害救済制度の問い合わせ先>

(独) 医薬品医療機器総合機構 電話0120-149-931(フリーダイヤル)
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

発売元

株式会社 明治

136-8908 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋 2-4-16

技術提携：ムンディファーマ B.V.