



メンソレータム®

エキシブ®

きわケア®ジェル



目立って気になる

爪まわりなどの水虫に

爪まわりは凹凸があり、治療薬がなかなか届きづらい場所です。
「メンソレータム®エキシブ®W きわケア®ジェル」は爪ぎわに潜む水虫菌にまで
抗真菌剤をスーッと浸透させることで見た目が気になる
爪まわりの水虫を治療することを考えた水虫治療薬です。

特徴

抗真菌剤 「テルビナフィン塩酸塩」配合

爪ぎわに潜む水虫菌まで、浸透殺菌します。

届きづらい爪ぎわまで！

スーッと浸透するジェルタイプ

- 水虫による炎症を抑える
「グリチルレチン酸」配合
- かゆみを鎮める
「リドカイン」「ジフェンヒドラミン塩酸塩」配合
- におい菌も殺菌する
「イソプロピルメチルフェノール」配合



水虫は治せる！
きちんと治療して清潔でキレイな素足へ！

[水虫治療のポイント]

1. 清潔に保つ

清潔は水虫治療の第一条件です。患部はせっけん
でよく洗い、いつもすっきり清潔に保ちましょう。

3. 薬は患部の周囲にも塗る

水虫菌は、症状があらわれている範囲より広く
潜んでいることが多いため、薬は患部を中心に、
広めに塗りましょう。薬の塗布は皮フがやわらか
くなっているお風呂上がりがおすすめです。

2. しっかり乾燥

水虫菌は乾燥が苦手です。汗をかいたりぬれたり
した後は、タオルで患部を拭いてしっかり乾燥
させましょう。

4. 根気強く治療を続ける

水虫菌はしつこい菌です。症状が治まり、治った
かな？と思っても水虫菌は死滅していないことが
多く、再発の原因になります。根治するためには、
症状が治まったと思ってもしばらくの間は治療を
続けましょう。

※爪水虫は医師のもと、適切な治療が必要です。

使用前にこの説明書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

水虫・たむし用薬 【販売名】メンソレータムエクシブWきわケアジェル

第2類医薬品

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

1. 次の人は使用しないでください。本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 次の部位には使用しないでください。

(1) 目や目の周囲、粘膜(例えば、口腔、鼻腔、膣等)、陰のう、外陰部等

(2) 湿疹 (3) 潤潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部

🗨️ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

(1) 医師の治療を受けている人 (2) 乳幼児 (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (4) 患部が顔面又は広範囲の人 (5) 患部が化膿している人 (6) 「湿疹」か「水虫、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人(陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い) (7) 妊婦又は妊娠している可能性のある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮フ	かぶれ、刺激感、熱感、鱗屑・落屑(フケ、アカのような皮フのはがれ)、ただれ、乾燥・つっぱり感、皮フの亀裂、痛み、色素沈着、発疹・発赤*、かゆみ*、はれ*、じんましん*

*:全身に発現することもあります。

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合や、本剤の使用により症状が悪化した場合は使用を中止、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

【効能】 水虫、いんきんたむし、ぜにたむし

【用法・用量】 1日1回、適量を患部に塗布してください。

＜用法・用量に関連する注意＞

(1) 定められた用法を厳守してください。

(2) 患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。

(3) 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。

(4) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

(5) 外用にのみ使用してください。

【成分・分量】 テルピナフィン塩酸塩 1.0g、イソプロピルメチルフェノール 1.0g、リドカイン

(100g中) 2.0g、ジフェンヒドラミン塩酸塩 1.0g、グリチルレチン酸 0.1g

添加物として、エタノール、乳酸、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒプロメロース、酢酸トコフェロール、ニコチン酸アミド、香料を含有する。

【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密閉して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 本剤のついた手で、目や粘膜に触れないでください。

(4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)

(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早くご使用ください。

(6) 本剤は合成樹脂等であつたり、塗料を溶かすことがあるため、家具や床等につかないようご注意ください。

(7) 火気に近づけないでください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになっているのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただければ、「あなたに応えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)

エクシブ ホームページURL <http://jp.rohto.com/exiv/>

ロート製薬株式会社

大阪市生野区巽1-8-1

MADE IN JAPAN

401609601