

飲みやすい錠剤

胃酸に速攻

(速効性制酸剤配合)

# パンシロン<sup>®</sup> キュア

胃痛・胃酸逆流  
などによる胸やけに

食前の空腹時にも、食後にも飲める



1回2錠

飲みやすい  
錠剤 タイプ

30錠

ロート製薬

第2類医薬品

《販売名》パンシロンキュアSP錠



お客様安心サポートデスク  
お気軽にご相談ください。  
東京:03-5442-6020  
大阪:06-6758-1230  
受付時間 9:00~18:00  
(土、日、祝日を除く)



パウチでエコ

切り取り線

吸湿しないように、服用のつどチャックをしっかりとしめること 胃腸薬

**【効能・効果】** 胃痛、胸やけ、胃酸過多、胃部不快感、胃部膨満感、もたれ(胃もたれ)、胃重、胸つかえ、げっぷ(おくび)、はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、恶心)、嘔吐、飲み過ぎ(過飲)

### ⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと (守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)

1. 次の人は服用しないこと (1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (2)妊娠又は妊娠していると思われる人 (3)透析療法を受けている人
2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないこと: 胃腸鎮痛鎮痙薬、乗物酔い薬
3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないこと(目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがある)
4. 長期連用しないこと

### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。
  - (1) 医師の治療を受けている人 (2) 授乳中の人の (3) 高齢者 (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人 (5) 次の症状のある人: 排尿困難 (6) 次の診断を受けた人: 緑内障、腎臓病、甲状腺機能障害
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。  
その場合は直ちに医師の診療を受けること。

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	はきけ、胃部膨満感
循環器	動悸
泌尿器	排尿困難
その他	目のかすみ

  

症状の名称	症 状
アナフィラキシー様症状	服用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ等があらわれる
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。便祕、下痢、口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

**【用法・用量】** 次の1回量を1日3回食前または食後に、水又はお湯で服用すること。

15才以上…1回2錠、15才未満…服用しないこと <用法・用量に関連する注意> 用法・用量を厳守すること。**【成分・分量】**(6錠中)  
水酸化マグネシウム 450mg、合成ヒドロタルサイト 780mg、沈降炭酸カルシウム 900mg、アルジオキサ 150mg、ビレンゼビン塩酸塩水和物 46.9mg、炭酸水素ナトリウム 240mg、チンピ末 300mg。添加物として、L-アルギニン、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、輕質無水ケイ酸、クロスカルメロースナトリウム、アスペルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、ステアリン酸Mg、L-メントール、香料を含む。**【保管及び取扱上の注意】**(1)直射日光の当たらない温湿度の少ない涼しい所に保管すること。(2) 小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。(5)まれに錠剤に黒い点がみられるが品質には問題ない。

副作用被害救済制度の問合せ先 0120-149-931

ロート製薬株式会社 大阪市生野区巽西1-8-1  
お客様安心サポートデスク: 06-6758-1230

使用期限  
製造番号



401522301