

第3類医薬品
南天のと館
黒糖シナモン風味

押してあける

1錠あたり7kcal

紙：箱 067135
TISB401

ずつ口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。＜用法・用量に関する注意＞(1) 用法・用量を厳守してください。(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください。	

成分・分量 1日量(9錠)中
南天実乾燥エキス…500mg
添加物：黒砂糖、白糖、水アメ、トメントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバパウ、赤色3号、青色1号、黄色5号、香料

保管および取扱い上の注意(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手のとどかない所に保管してください。(3) 品質を保持するため、開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。(4) 期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVIR GROUP
南天のと館のブランドサイトはこちら
<http://nodoame.jp>

つらいせき、のどの痛みに効く
第3類医薬品
南天のと館
黒糖シナモン風味
18錠

黒糖シナモン風味 6錠×3包入(スチアルク包装)

南天実エキス配合

南天のと館

第3類医薬品

常盤薬品
NOEVIR GROUP

第3類医薬品 トキワ南天喉飴(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要ときに読めるように、大切に保管してください。

使用上の注意【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬など)【相談すること】1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦または妊娠していると思われる人。(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4) 次の症状のある人。高熱 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 3. 5〜6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 効能・効果 せき、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛み、のどのほれ 用法・用量 食後に服用してください。右表の1回量を1錠

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

第3類医薬品
南天のと館
黒糖シナモン風味

第3類医薬品
南天のと館 黒糖シナモン風味
4987156211725

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お寄せま相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00〜17:00(土、日、祝日を除く)
使用期限
製造番号
副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhin@aol.html>
0120-149-931