

第3類医薬品

南天のど飴 U はちみつ梅風味

4 987156 211756

お問い合わせは
常盤薬品工業株式会社
お客さま相談室0120-875-710まで
受付時間 9:00~17:00(土、日、祭日を除く)
使用期限
製造番号
副作用・副作用・副作用の回避について
(注)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenshou/igai.html
0120-149-931

常盤薬品 NOEVR GROUP

6錠×3包入(スチフク包装)

はちみつ梅風味

南天実工業と配合

南天のど飴 U

第3類医薬品

つらいせき、のどの痛みに効く

第3類医薬品

南天のど飴 U はちみつ梅風味

18錠

つらいせき、のどの痛みに効く

第3類医薬品

南天のど飴 U

はちみつ梅風味

第3類医薬品 南天のど飴U(せき止め薬)

服用に際しては、この説明文を必ずお読みください。
必要に応じて、大切に保管してください。

使用上の注意【してはいけないこと】(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください/他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など(鼻炎用内服薬、薬物酔い薬、アレルギー用薬など)【相談すること】1.次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦または妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(4)次の症状のある人。高熱、2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください 効能・効果 せき、のどの炎症による声がれ、のどのあれ、のどの不快感、のどの痛みのどのはれ 用法・用量 食前に服用してください。右表の1回量を1錠

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化 器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい

ずつ口の中に含み、かまずにゆっくり溶かしてください。なお、1回分を服用後は、2時間以上の間隔をおいて服用してください。【用法・用量に準ずる注意】(1)用法・用量を厳守してください。(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	3錠	3回
8才以上15才未満	2錠	
5才以上8才未満	1錠	
5才未満	服用しないでください	

成分・分量 1日量(9錠)中
南天実乾燥工キ
ス...500mg
添加物:白糖、水
アズ、ハチミツ、ク
エニ酸、トメントール、アラビアゴム、カラメル、タルク、カルナウバロウ、香料(エタノール)

保管および取扱い上の注意(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(3)品質を保持するため、開封後は袋の口を折り曲げて保管してください。(4)期限を過ぎた製品は服用しないでください。

製造販売元
常盤薬品工業株式会社
大阪市中央区安土町3-5-12
NOEVR GROUP
南天のど飴のブランドサイトはこちら
http://nodocame.jp

1錠あたり7kcal

紙 箱 067452
TSB401

第3類医薬品

南天のど飴 U

はちみつ梅風味