

服用に際して、この添付文書を必ずお読みください
また必要なときに読めるよう大切に保管してください
使用期限（パッケージ側面に記載）を過ぎた製品は服用しないこと



アルコールなどによる頭痛に

アルピタン®

第2類医薬品

漢方製剤

販売名：アルピタン

製品特徴

- アルコールなどによる頭痛、二日酔に効くお薬です
- 漢方処方“五苓散”が、過剰な水分やアルコールの排出を助け、つらい頭痛や二日酔を抑えます
- 素早く溶ける顆粒タイプです

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 今までに薬等により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ

3. 1ヶ月位（急性胃腸炎、二日酔に服用する場合には5～6回、水様性下痢、暑気あたりに服用する場合には5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

（裏面につづく）

効能・効果

体力に関わらず使用でき、のどが渇いて尿量が少ないもので、頭痛、はきけ、嘔吐、めまい、腹痛、むくみ等のいずれかを伴う次の諸症：水様性下痢、急性胃腸炎（しぶり腹のものには使用しないこと）、暑気あたり、むくみ、頭痛、二日酔

<効能・効果に関連する注意>

しぶり腹とは、残便感があり、くり返し腹痛を伴う便意を催すもののことである

用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はお湯で服用してください

年 齢	1 回 量	服用回数
大人(15才以上)	1 包	1日3回
7才以上 15才未満	2／3包	
4才以上 7才未満	1／2包	
2才以上 4才未満	1／3包	
2才未満	× 服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

(1) 定められた用法・用量を厳守すること

(2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2～3時間のことをいいます

成分・分量 1日量（3包：4.5g）中

五苓散料エキス…2.3g

タクシャ……………5.0g	チョレイ……………3.0g
ブクリョウ……………3.0g	ビャクジュツ……………3.0g
ケイヒ……………2.0g	より抽出

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する

●本剤は天然物（生薬）を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること

(2) 小児の手の届かない所に保管すること

(3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）

(4) 1包を分割して服用する場合、残った薬剤は袋の口を折り返して保管すること
また、保管した残りの薬剤は、その日のうちに服用するか捨てること

製品のお問合せは、お買い求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

発売元 **小林製薬株式会社**

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

ホームページ <http://www.kobayashi.co.jp>

製品のお問合せ先（お客様相談室）

0120-5884-01

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **小林製薬株式会社**

〒567-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

MADE IN JAPAN

10145581