

医薬品を正しく購入するための

説明文書

第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	大鵬かぜ内服液銀翹散																				
2	成分・分量	<p>1日量90mL(30mL×3本)中 銀翹散エキス 9.7g</p> <p>原生薬として</p> <table> <tr> <td>キンギンカ(金銀花)</td> <td>4.260g</td> <td>タンズシ(淡豆豉)</td> <td>2.136g</td> </tr> <tr> <td>レンギョウ(連翹)</td> <td>4.260g</td> <td>ゴボウシ(牛蒡子)</td> <td>2.136g</td> </tr> <tr> <td>キキョウ(桔梗)</td> <td>2.556g</td> <td>タンチクヨウ(淡竹葉)</td> <td>1.704g</td> </tr> <tr> <td>カンゾウ(甘草)</td> <td>2.556g</td> <td>ケイガイ(荊芥)</td> <td>1.704g</td> </tr> <tr> <td>ハッカ(薄荷)</td> <td>2.556g</td> <td>レイヨウカク(羚羊角)</td> <td>0.132g</td> </tr> </table>	キンギンカ(金銀花)	4.260g	タンズシ(淡豆豉)	2.136g	レンギョウ(連翹)	4.260g	ゴボウシ(牛蒡子)	2.136g	キキョウ(桔梗)	2.556g	タンチクヨウ(淡竹葉)	1.704g	カンゾウ(甘草)	2.556g	ケイガイ(荊芥)	1.704g	ハッカ(薄荷)	2.556g	レイヨウカク(羚羊角)	0.132g
キンギンカ(金銀花)	4.260g	タンズシ(淡豆豉)	2.136g																			
レンギョウ(連翹)	4.260g	ゴボウシ(牛蒡子)	2.136g																			
キキョウ(桔梗)	2.556g	タンチクヨウ(淡竹葉)	1.704g																			
カンゾウ(甘草)	2.556g	ケイガイ(荊芥)	1.704g																			
ハッカ(薄荷)	2.556g	レイヨウカク(羚羊角)	0.132g																			
3	用法・用量	<p>次の量を食間によく振ってから服用してください</p> <table> <thead> <tr> <th>年齢</th> <th>1回量</th> <th>1日服用回数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>成人(15歳以上)</td> <td>1本</td> <td>3回(食間)</td> </tr> <tr> <td>15歳未満</td> <td>服用しないでください</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	年齢	1回量	1日服用回数	成人(15歳以上)	1本	3回(食間)	15歳未満	服用しないでください												
年齢	1回量	1日服用回数																				
成人(15歳以上)	1本	3回(食間)																				
15歳未満	服用しないでください																					
4	効能・効果	かぜによるのどの痛み・せき・口(のど)の渴き・頭痛																				
5	保健衛生上の危害を防止するために必要な事項	<p>短期間の服用にとどめ、連用しないでください</p> <p>次に該当する人はお申し出ください</p> <ul style="list-style-type: none"> ・医師の治療を受けている人 ・妊婦又は妊娠していると思われる人 ・体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人) ・胃腸の弱い人 ・高齢者 ・今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人 ・むくみの症状のある人 ・高血圧、心臓病、腎臓病の診断を受けた人 																				
6	薬剤師または登録販売者が必要と判断する事項																					

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。