



大正製薬

外用消炎鎮痛プラスター

トクホシ

T O K U H O S I

● 肩こり・腰痛・筋肉痛に

● 肌にやさしい

● はがれにくい



● 肩こり・腰痛・筋肉痛に

炎症を抑え痛みをやわらげる

サリチル酸メチル・血行をよくするビタミンEを配合

● 肌にやさしい

皮膚の炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合

● はがれにくい

四スミを丸くカットしているのではがれにくい

第3類医薬品

ご使用に際してこの説明文書
を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう
大切に保管してください。



特長

トクホンは、炎症を抑え痛みをやわらげるサリチル酸メチル、血行をよくするビタミンE、皮膚の炎症を抑えるグリチルレチン酸を配合して、肌にやさしく、筋肉の炎症と痛みを抑えるのに適した貼り薬です。四スミを丸くして、使用中はがれにくくしています。



△使用上の注意

- **してはいけないこと**

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)

 1. 次の部位には使用しないこと
 - 1) 目の周囲、粘膜など
 - 2) 湿疹、かぶれ、傷口
- **相談すること**
 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - ・ 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
 2. 使用后、皮膚に発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

効能又は効果

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、しもやけ


用法及び用量

薬剤面をおおったはく離紙をはがし、1日数回患部に貼付してください。

- 1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、刺激が強く感じられることがあるため、7歳未満の人への使用はさけてください。
- 2) 患部を清潔にしてから使用してください。
- 3) 皮膚の弱い人は同じ所に続けて使用しないでください。
- 4) 使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に小片を貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれなどの症状がおきないことを確かめてから使用してください。

保管及び取扱い上の注意

- 1) 直射日光をさけ、涼しい所に保管してください。
- 2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- 3) 20枚入袋開封後は保存袋に入れて保管してください。
- 4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。



成分及び分量

<有効成分膏体100g(0.54m²)中>

添加物として酸化亜鉛、ジブチルヒドロキシトルエン、生ゴム、ポリインブレン、ロジンエステル、その他2成分を含有します。

成分	分量	はたらき
l-メントール	6.5g	知覚神経を軽くマヒさせる
dL-カンフル	1.1g	痛みをやわらげる
サリチル酸メチル	7.3g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ビタミンE酢酸エステル	1.35g	血行をよくする
グリチルレチン酸	0.18g	皮膚の炎症を抑える

発売元
大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>

製造販売元
株式会社 トクホン
東京都港区芝2-28-8

大正製薬(株) お客様119番室

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
0120-149-931