

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

ウェルクスH

製品の特徴

ウェルクスHは、漢方の古典「金匱要略」に収載されている漢方処方「八味地黄丸」をエキシ化し、服用しやすい顆粒剤にしたものです。

八味地黄丸は、体力中等度以下で、疲れやすくて、手足が冷えやすい方の足や腰の痛み、しびれ、高齢者のかすみ目、夜間尿、頻尿などに用いられます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないでください。

- (1) 生後3ヵ月未満の乳児。
- (2) 胃腸の弱い人。
- (3) 下痢しやすい人。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
 - (3) のぼせが強く赤ら顔で体力の充実している人。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振、胃部不快感、腹痛
その他	動悸、のぼせ、口唇・舌のしびれ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続または増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください。

効能・効果

体力中等度以下で、疲れやすくて、四肢が冷えやすく、尿量減少又は多尿で、ときに口渴があるものの次の諸症：

下肢痛、腰痛、しびれ、高齢者のかすみ目、かゆみ、排尿困難、残尿感、夜間尿、頻尿、むくみ、高血圧に伴う随伴症状の改善（肩こり、頭重、耳鳴り）、軽い尿漏れ

用法・用量

次の量を1日3回食前または食間に水またはお湯と一緒に服用してください。

年 齢	1 回量	1 日服用回数
大人（15才以上）	1 包	3 回
15才未満7才以上	2/3 包	
7才未満4才以上	1/2 包	
4才未満2才以上	1/3 包	
2才未満	1/4 包	

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分・分量（3包（9.0g）中）

八味地黄丸エキス……………4.60g

ジオウ……………5.0g	サンシュユ……………3.0g	サンヤク……………3.0g
タクシャ……………3.0g	ブクリョウ……………3.0g	ボタンピ……………3.0g
ケイヒ……………1.0g	ブシ末……………1.0g	

添加物として、乳糖水和物、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 1包を分割して服用した残りは、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6) 本剤は、天然物（生薬）のエキスをを用いていますので、製品により色が多少異なる場合がありますが、効果に変わりはありません。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記にお願い致します。

帝國製薬株式会社 お客様相談室 電話 (0879) 25-2363

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日を除く）

販売元 **ティコクファルマケア株式会社**

香川県東かがわ市三本松567番地

発売元 **帝國製薬株式会社**

香川県東かがわ市三本松567番地

製造販売元

帝國漢方製薬株式会社

徳島県阿波市土成町土成字北原80番11