

この説明書は
必要なときに
読めるよう、
大切に保管
してください。



◆ ご使用前にこの説明書を必ずお読みください。
◆ 本剤の使用により好ましくない症状があらわれた場合には、
直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。



説 明 書

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構

http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話：0120-149-931 (フリーダイヤル)



大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号

お客様119番室／電話 03-3985-1800



第1類医薬品

壮年性脱毛症における発毛剤

ミノキシジル

毛乳頭細胞に直接働きかける発毛成分

パントテニールエチルエーテル

毛細胞に栄養を補給

トコフェロール酢酸エステル

皮脂の酸化を防ぎ頭皮を保護

1-メントール

頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあたえる

- ◆ リアップジェットは、発毛成分ミノキシジルを配合した心地よい使用感のジェット噴射式エアゾールです。
- ◆ 頭皮に直接押しあてて15噴射することにより、1回使用量を手軽に塗布できる定量噴射容器を採用しました。
- ◆ ミノキシジルが毛包に直接作用して、発毛、育毛効果を発揮するとともに、その他の成分が頭皮の環境をととのえ、清涼感をあたえます。

安全に、かつ効果的にお使いいただくために、この説明書をよくお読みください。

安全に、かつ効果的にお使いいただくために…

目次

使用上の注意／してはいけないこと	3
使用上の注意／相談すること	4
使用上の注意／その他の注意	6
効能・効果	7
成分・分量	7
用法・用量	8
容器の使用方法	9
保管及び取扱い上の注意	11
正しい洗髪方法	11
1日2回のヘアケア習慣	12
ヘアケアQ&A	13
お困りのことがあったら	14

リアップジェットは、
「壮年性脱毛症^{*}における発毛剤」です。

髪が成長するには時間がかかります。発毛の効果を
実感するまで、少なくとも6ヵ月間、用法・用量を守って
正しくお使いください。

また、その後は脱毛の進行予防の効果(既に始まって
しまった脱毛がそれ以上進行するのを防ぐ効果)を維持
するためにも、継続してご使用になることをおすすめ
いたします。

^{*} 壮年性脱毛症とは、一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと
何年もかけて進行し、目立つようになるものです。

使用上の注意

してはいけないこと

守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こる可能性があります。

① 次の人は使用しないでください。

1 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2 女性。

女性の方はリアップシリーズの女性用製品をご使用ください。

3 未成年者(20歳未満)。

国内での使用経験がありません。

4 壮年性脱毛症以外の脱毛症(例えば、円形脱毛症、甲状腺疾患による脱毛等)の人、あるいは原因のわからない脱毛症の人。

本剤は壮年性脱毛症でのみ有効です。

5 脱毛が急激であったり、髪が斑状に抜けている人。

壮年性脱毛症以外の脱毛症である可能性が高い。

② 次の部位には使用しないでください。

1 本剤は頭皮にのみ使用し、内服しないでください。

血圧が下がる等のおそれがあります。

2 きず、湿疹あるいは炎症(発赤)等がある頭皮。

きず等を悪化させることがあります。

③ 本剤を使用する場合は、他の育毛剤及び外用剤(軟膏、液剤等)の頭皮への使用は、させていただきます。また、これらを使用する場合は本剤の使用を中止してください。

これらの薬剤は本剤の吸収に影響を及ぼす可能性があります。



相談すること

① 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください。

1 今までに薬や化粧品などによりアレルギー症状(例えば、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。

2 高血圧の人、低血圧の人。

本剤は血圧に影響を及ぼす可能性が考えられます。

3 心臓又は腎臓に障害のある人。

本剤は心臓や腎臓に影響を及ぼす可能性が考えられます。

4 むくみのある人。

むくみを増強させる可能性が考えられます。

5 家族、兄弟姉妹に壮年性脱毛症の人がいない人。

壮年性脱毛症の発症には遺伝的要因が大きいと考えられます。

高齢者(65歳以上)。

一般に高齢者では好ましくない症状が発現しやすくなります。

7 次の診断を受けている人。
甲状腺機能障害(甲状腺機能低下症、甲状腺機能亢進症)。

甲状腺疾患による脱毛の可能性あります。

2 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	頭皮の発疹・発赤*、かゆみ、かぶれ、ふけ、使用部位の熱感等
精神神経系	頭痛、気が遠くなる、めまい
循 環 器	胸の痛み、心拍が速くなる
代 謝 系	原因のわからない急激な体重増加、手足のむくみ

*:頭皮以外にあらわれることもあります。

3 1年間使用して、次のいずれにおいても改善が認められない場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

脱毛状態の程度、生毛・軟毛の発生、硬毛の発生、抜け毛の程度。(太い毛だけでなく細く短い抜け毛の減少も改善の目安となります。)

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

4 使用開始後1年以内であっても、脱毛状態の悪化や、次のような脱毛が見られた場合は、使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談してください。

頭髮以外の脱毛、斑状の脱毛、急激な脱毛など。

壮年性脱毛症以外の脱毛症であったり、脱毛が他の原因によるものである可能性があります。

その他の注意

1 毛髪が成長するには時間がかかります。効果がわかるようになるまで少なくとも6ヵ月間、毎日使用してください。

本剤の有効性は6ヵ月間使用した場合に認められています。

2 毛髪が成長する程度には個人差があり、本剤は誰にでも効果があるわけではありません。

3 効果を維持するには継続して使用することが必要で、使用を中止すると徐々に元に戻ります。

本剤は壮年性脱毛症の原因を取り除くものではありません。

効能・効果

壮年性脱毛症における発毛、育毛及び
脱毛(抜け毛)の進行予防。

この医薬品の対象となる壮年性脱毛症

リアップジェットは、以下のようなパターンの
脱毛あるいは薄毛に効果があります。



※脱毛範囲がこれら以上の場合には効果が得られない可能性があります。

成分・分量

薬液 100mL中

成分	分量	はたらき
ミノキシジル	1.0g	発毛、育毛及び脱毛の進行を予防します。
パントテニール エチルエーテル	1.0g	毛細胞に栄養を補給し、頭皮を健全な 状態にします。
トコフェロール 酢酸エステル	0.08g	皮脂の酸化を防ぎ、頭皮を保護します。
l-メントール	0.3g	頭皮のかゆみをおさえ、清涼感をあた えます。

添加物：カミツレ油、1,3-ブチレングリコール、クエン酸、エタノール、DME
(内容量 100mL 中には薬液 67mL、噴射剤 33mL を配合)

用法・用量

成人男性(20歳以上)が、1日2回、1回薬液1mL
(15噴射)を脱毛している頭皮に噴射する。

容器には定量バルブが装着されておりますので、噴射部を矢印の方向に回してロックを解除し、頭皮に容器先端を15回ゆっくり押しあてることで薬液1mLを噴射できます。(15噴射後に自動的にロックされます。)1回薬液1mLのご使用は、脱毛範囲の大小に関係なくお守りください。

薬液1mLは塗り広げれば、頭皮全体に十分に行きわたる量として設計してあります。本品1本は1日2回のご使用で、約1ヵ月分です。(内容量100mL中には薬液67mL、噴射剤33mLを配合しています。)

【注 意】

- 1 用法・用量の範囲より多量に使用しても、あるいは頻繁に使用しても効果はあがりません。定められた用法・用量を厳守してください。(決められた以上に多く使用しても、効果の増加はほとんどなく、副作用の発現する可能性が高くなります)
- 2 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- 3 薬液のついた手で、目などの粘膜にふれると刺激があるので、手についた薬液はよく洗い落としてください。
- 4 アルコールなどに溶けるおそれのあるもの(メガネわく、化学繊維等)にはつかないようにしてください。
- 5 整髪料及びヘアセットスプレーは、本剤を使用した後に使用してください。
- 6 染毛剤(ヘアカラー、毛染め、白髪染め等)を使用する場合には、完全に染毛を終えた後に本剤を使用してください。
- 7 本品はエアゾール剤ですので、頭皮の同じ箇所に連続して噴射しないでください。

1回分が15噴射です。

キャップ



噴射部

窓

キャップを真上に引いては
ずします。

容器側面にある窓全体に赤い目印が来ていることを確認してください。

噴射部を矢印の方向に「カチッ」と音がするまで回し、ロックを解除してください。



ロックが解除されると窓の赤い目印が見えなくなり、薬液の噴射が可能になります。

注意)
赤い目印が見えなくなったら、それ
以上回さないでください。


容器を逆さにして、噴射部を頭皮に押しあてては離しながら、手髪の薄い部分全体に噴射してください。

繰り返し
15噴射

注意)

●強く押しつけたり引っかいたりすると、頭皮が傷つくおそれがありますので、おやめください。

●本品はエアゾール剤ですので、頭皮の同じ箇所に連続して噴射しないでください。



15噴射を終えると自動的にロックがかかり、噴射部が押し込めなくなります。同時に、窓に赤い目印があらわれ、噴射終了です。

注意)

ロックがかかるまで噴射してください。

Diagram illustrating the cap and window mechanism. The top part shows a blue cap with a downward arrow indicating it is closed. The bottom part shows the cap with a red square window, labeled with a red box containing the character '窓' (Mado), indicating the window is open.

窓に赤い目印が来ていることを確認し、キャップをして保管してください。

注意)

使用後に噴射部が汚れている場合はふきとってください。

窓に赤い目印が出ていない場合は、薬液を規定量噴射することが出来ません。
赤い目印が出るまで噴射した後、あらためてご使用ください。

保管及び取扱い上の注意

- 1 使用後、キャップをして、直射日光や高温、寒冷の場所をさけ、涼しい所に保管してください。
- 2 小児の手のとどかない所に保管してください。
- 3 誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- 4 火気に近づけないでください。
- 5 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

正しい洗髪方法

- 1 めるま湯でざっと髪と頭皮の汚れを洗い流します。
- 2 洗髪時の髪への摩擦を少なくするため、シャンプーは直接髪につけず、手のひらでよく泡だててお使いください。
- 3 爪を立てずに、指の腹で頭皮をマッサージするように洗います。
- 4 シャンプーをよく洗い流します。すずぎ残りはふけ・かゆみの原因になります。



1日2回のヘアケア習慣

リアップジェットは**1日2回**、1回1mLを
脱毛している頭皮に噴射します。

◎ご使用になる時間について

1日2回のタイミングは、ライフスタイルに応じて様々ですが、時間間隔をあけて、例えば朝夕にお使いいただくのが効果的です。

また、できるだけ頭皮が清潔な状態でご使用になることをおすすめします。ご自身のライフスタイルに合わせた習慣をお作りください。

例) 洗髪のタイミングに合わせて…



*1: マッサージはリアップジェット噴射前に行ってください。

*2: リアップジェットは十分髪が乾いてからお使いください。

ヘアケアQ&A

Q 壮年性脱毛症とはどのような脱毛症ですか？

A 徐々に進行する遺伝性の薄毛・抜け毛です。

一般的に遺伝性の薄毛又は抜け毛で、ゆっくりと何年もかかって進行します。普通、頭髮は2～6年程度をかけて太くしっかりと成長しますが、壮年性脱毛症の方ではその成長期間が短くなってしまいうため、細く短い毛になってしまいます。早い人では20代から発症することもあります。

Q 1日2回より多く使ってもよいですか？

A リアップジェットは「1日2回」、お守りください。

1日2回より多く使ったり、1回の量を多く使っても効果はあがりません。回数を増やしたり、多く塗ったりしても、髪の毛の成長が速くなることはほとんどなく、かえって副作用の頻度を上昇させるおそれがあります。また使用を忘れたからといって、次回に倍量使うこともおやめください。

Q 毎日洗髪した方がよいですか？

A 1日1回の洗髪がおすすめです。

頭皮は髪の毛の土台です。頭皮を不潔にしていると毛根に脂がたまり、髪の毛の生育や発毛・育毛剤の吸収を妨げたりします。「洗髪すると髪が抜けるから…」といって髪を洗わないようにする方がいますが、正しい洗髪方法を行えば、1日に1回の洗髪が髪の毛のためにおすすめです。洗髪で抜ける毛は一般に成長が終わった髪で、少し引っ張っただけでも抜ける状態になっています。

Q マッサージはした方がよいですか？

A リアップジェット使用前に行うことをおすすめします。

マッサージは頭皮の血行を良くするために大切です。頭皮の血行が良くなると、血液中の髪を作るのに必要な栄養が頭皮に行きわたります。リアップジェット使用前の習慣として続けられることをおすすめします。

Q 整髪料は使ってもよいですか？

A リアップジェットが乾いてからお使いください。

日常のヘアケア習慣を変える必要はありませんが、リアップジェットの吸収を妨げないために、リアップジェットの使用后、乾いてから整髪料をお使いください。

お困りのことがあったら

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

連絡先

大正製薬株式会社 お客様119番室

〒170-8633 東京都豊島区高田3丁目24番1号

電話 03-3985-1800

受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)

◆本品の詳しい情報やヘアケアに関するお役立ち情報は「リアップホームページ」へ…

 <http://www.taisho.co.jp/riup/>