

ご使用に際し、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

RAKOOL

第2類医薬品

ラクール  
ラクペタン<sup>®</sup>シッフ<sup>®</sup>FB

消炎鎮痛シッフ剤

冷感

35枚入  
(7枚×5袋)  
1枚 10cm×14cm

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

- (1) 本剤または本剤の成分によりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
- (2) ぜんそくを起こしたことがある人。
- (3) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (4) 15歳未満の小児。

2. 次の部位には使用しないでください

- (1) 目の周囲、粘膜等。
- (2) 湿疹、かぶれ、傷口。
- (3) みずむし・たむし等または化膿している患部。

3. 連続して2週間以上使用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、ヒリヒリ感、かぶれなど
症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、捻挫

用法・用量

○表面のフィルムをはがし、1日2回を限度として患部に貼付してください。

○15歳未満の小児は使用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>

(1)定められた用法・用量をお守りください。(2)皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。(3)本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤ですので、症状がある場合だけ使用してください。(4)汗をかいたり、患部がぬれている時は、よく拭き取ってから使用してください。

成分・分量(膏体100g中) [1枚10cm×14cm、膏体量10g]

フェルピナグ……………0.7g

添加物:カオリン、酸化チタン、ポリアクリル酸部分中和物、D-ソルビトール、グリセリン、ポリソルベート80、ケイ酸アルミン酸Mg、カルボキシビニルポリマー、pH調節剤、エデト酸Na水和物、ℓ-メントール

保管及び取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4)品質保持のため、未使用分は袋に入れ、ファスナーを閉めて保管してください。(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

製造番号

使用期限



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html  
<電話>0120-149-931 (フリーダイヤル)

(お問い合わせ先)

ラクール薬品販売株式会社  
フリーダイヤル 0120-86-8998



発売元  
ラクール薬品販売株式会社  
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号



製造販売元  
東光薬品工業株式会社  
東京都足立区新田2丁目16番23号



1枚を押して  
開けてください。