

効能・効果

湿疹、皮ふ炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。なお、本剤の使用開始目安年齢は生後3箇月以上です。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 本剤は外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 定められた用法・用量を守ってください。

*患部はなるべくかかず、かきこわす前の治療がお勧めです。また、患部が汚れている場合はよく拭いてから塗布してください。

成分・分量

ジフェンヒドラミン塩酸塩…2.0g

パンテノール…1.0g

添加物:ベンザルコニウム塩化物、ヒドロキシプロピルセルロース、pH調節剤

製造番号

使用期限

第3類医薬品

無香料・無着色

RAKOO


50mL



弱酸性 低刺激

アルコール・メントール無配合

お子様に優しい!



手を汚さず塗れる
広範囲に便利な
首曲がりタイプ



かゆみ 虫さされ あせも

ご使用の際は、スポンジが破れるおそれがあるため、薬液を十分浸透させてから塗布してください。



保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- 使用期限(箱及び容器に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、品質保持の点から開封後はなるべく早く使用してください。

お子様が誤ってラクビオクールベビー液を口に入れてしまった場合

○少量なめた程度では影響はありませんが、量が多いと眠気があらわれることがあります。

○大量に(目安として5mL以上)飲み込んだときや、めまい、はきけ、倦怠感(だるさ)、呼吸異常などの症状がある場合はなるべく早く医師の診療を受けてください。

ここから
開けてください

ご使用に際し、外箱に記載の説明文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

アルコールやステロイドを使用していないので、お子様にもお使いいただける、お肌にやさしいかゆみ止めです。

【使用上の注意】

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 薬などによりアレルギー症状(発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。
 - (3) 湿潤やただれのひどい人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 3~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談してください

発売元

ラクール薬品販売株式会社
東京都足立区鹿浜1丁目9番14号

◆お問い合わせ先◆
フリーダイヤル
0120-86-8998

製造販売元

東光薬品工業株式会社
東京都足立区新田2丁目16番23号

副作用被害救済制度
電話 0120-149-931