

強肝、解毒、

12錠

強力グットA錠

第3類医薬品

販売名：強肝、解毒、強力グットA錠

成分・分量 (1錠中)

オロチン酸……………	30 mg	アスコルビン酸(V.C)…	30 mg
ウコンエキス……………	2 mg	チアミン塩化物塩酸塩(V.B ₁)	… 2 mg
(原生薬換算量4mg)		リボフラビン(V.B ₂)…	1 mg
DL-メチオニン…	30 mg	ニコチン酸アミド…	10 mg
ゴオウ(牛黄)……	0.5 mg	パントテン酸カルシウム…	5 mg

添加物としてバレイショデンプン、乳糖、タルク、ステアリン酸Mg、セラック、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、炭酸Ca、カオリン、カルナウバロウ、サラシミツロウ、黄色5号を含有します。

効能・効果

宿酔(二日酔い)、自家中毒、流行性肝炎、じんましん、湿疹、吹出物、にきび、しもやけ、アレルギー性体質、肌のあれ、強精、病後回復期ならびに妊産婦の栄養補給

用法・用量

肝炎、肝硬変、肝臓炎、黄疸、じんましん、皮膚病のかゆみ、産前産後の疲労回復には、1日5錠～10錠。

疲労回復、強壮、自家中毒、宿酔(二日酔い)、悪酔の予防には、1日3錠～5錠。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 用法・用量を厳守してください。

製造販売元 **合名会社 東宝製薬**

岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地

お客様相談窓口 電話 058-251-6668(代表)

〔月～金曜日 10:00～16:00(祝日を除く)〕

⚠ 使用上の注意

相談すること

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師または登録販売者に相談してください



袋・シート：
PE、金属



〈保管及び取扱い上の注意〉

- (1) 直射日光の当たらない
湿気の少ない涼しい所
に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所
に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えな
いください。
(誤用の原因になったり
品質が変わります。)
- (4) 湿気により錠剤表面が
変色することがありま
すので、ぬれた手で触
れないでください。
- (5) 本剤は使用期限表示品
ですので表示の期限内
に使用してください。
また、使用期限を過ぎ
た製品は服用しないで
ください。

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

製造
期限
使用

■ 滋養強壮・ビタミン含有保健薬 ■ 販売名: 強肝、解毒、強力グットA錠

第3類医薬品*

強肝、解毒、 強力グットA錠

肝臓は新陳代謝をつかさどる最も重要な臓器で栄養素の供給や貯蔵、更に体内でできた有害物質や体外から入った毒物を体外に排泄する等、重要な役目をしています。しかし、肝臓はこの様な重要な働きをする一方、いたみやすく、気付かないうちに潜在性肝臓障害が起きていることが多いのです。



使用上の注意



相談すること*

しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

成分・分量とその働き

成分	1錠中	主な働き
オロチン酸	30mg	肝細胞の再生を速める。
ウコンエキス (原生薬換算量)	2mg (4mg)	肝細胞を刺激して肝臓の働きを活発にする。
D L -メチオニン	30mg	体内から有害物質を取り除き、体外に排泄する。(解毒作用) 肝臓に沈着した脂肪を運び出す。
ゴオウ (牛黄)	0.5mg	肝臓の炎症を鎮め、胆汁分泌を促進する。
アスコルビン酸 (V.C)	30mg	食品で摂取した各栄養素(炭水化物、脂質、たんぱく質)の代謝を助け、肝細胞の働きをサポートするビタミン群です。
チアミン塩化物塩酸塩 (V.B1)	2mg	
リボフラビン (V.B2)	1mg	
ニコチン酸アミド	10mg	
パントテン酸カルシウム	5mg	


※添加物としてバレイシヨデンブ、乳糖、タルク、ステアリン酸Mg、セラック、アラビアゴム、ゼラチン、白糖、炭酸Ca、カオリン、カルナウバロウ、サラシミツロウ、黄色5号を含有します。

効能・効果

宿酔（二日酔い）、自家中毒、流行性肝炎、じんましん、湿疹、吹出物、にきび、しもやけ、アレルギー性体質、肌のあれ、強精、病後回復期ならびに妊産婦の栄養補給

用法・用量

- 肝炎、肝硬変、肝臓炎、黄疸、じんましん、皮膚病のかゆみ、産前産後の疲労回復には、1日5錠～10錠。
- 疲労回復、強壮、自家中毒、宿酔（二日酔い）、悪酔の予防には、1日3錠～5錠。



<用法・用量に関連する注意>

- 用法・用量を厳守してください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) ピンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防ぐためのものです。開封後は不要となりますので取り除いてください。
- (5) ピンの中には乾燥剤が入っています。服用しないでください。
- (6) 湿気により錠剤表面が変色することがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- (7) 本剤は使用期限表示品ですので外箱及びラベルに表示の期限内に使用してください。また、開封した後は、服用のつどピンのフタをよくしめ、品質保持の点から開封日より6ヶ月以内にご使用ください。

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までお願い申し上げます。

合名会社 東宝製薬 電話 058-251-6668（代表）

受付時間：10:00～16:00（土・日・祝日を除く）

製造販売元 **合名会社 東宝製薬**
岐阜市沖ノ橋町3丁目45番地