

外傷救急薬

第3類医薬品

ケンエーシムチンS

【使用上の注意】



注 意

相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 患部が広範囲の人。
 - 深い傷やひどいやけどの人。
- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒、痔疾の場合の肛門の殺菌・消毒

【用 法 用 量】

1日数回、患部に噴霧又はガーゼ・脱脂綿に浸して塗布してください

〈用法に関連する注意〉

- 用法を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成 分 分 量】

100mL中

ベンゼトニウム塩化物……………0.1g

アラントイン……………0.2g

クロルフェニラミンマレイン酸塩……………0.2g

添加物：エタノール、l-メントール、pH調節剤、香料、チモール、サリチル酸メチル

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）

【包

装】

80mL



健栄製薬株式会社

大阪市中央区伏見町2丁目5番8号