

細菌・真菌、ウイルスなどを殺菌・消毒

第3類医薬品

ケンエー うがい薬S

(ポビドンヨード製剤)

KENEI GARGLE S

ケンエーうがい薬Sは、各種の細菌、真菌、ウイルスなどの微生物に迅速な殺菌・消毒効果があるポビドンヨードを配合したうがい薬で、口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去にすぐれた効果を発揮します

【使用上の注意】



注 意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 口内のひどいただれのある人
- 甲状腺機能障害の診断を受けた人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消 化 器	吐き気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります

その場合は直ちに医師の診療を受けてください

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

【用 法 用 量】


1回、本剤2～4mLを水約60mLに薄めて、1日数回うがいしてください

〈用法用量に関連する注意〉


- 用法用量を厳守してください
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- うがい用에만使用してください
- 使用のつど希釈し、希釈後は早目に使用してください

【使用法】 (60mLに記載)

キャップをはずして容器をさかさに持ち、指でゆっくり押して、1～2目盛の薬剤をコップに入れてください。1目盛で2mLの薬剤がでます。一般に使われているコップに水を1/3満たせば約60mLです。薄める水の量はこれを目安にしてください。

**【使用法】** (130mL、300mLに記載)

添付の計量カップを斜めにして本剤を2～4目盛のところまで入れ、水を60の目盛まで加えて薄めてからうがいしてください

**必ずうすめてご使用ください****【成分分量】**

100mL中 ポビドンヨード7.0g (有効ヨウ素700mg) 含有

添加物：エタノール、l-メントール、サッカリンNa水和物、プロピレングリコール、香料

〈成分分量に関連する注意〉

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料（義歯等）が変色することがあります

【保管及び取り扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- 小児の手の届かない所に保管してください
- 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）
- 衣類等に付着したときは、すぐに水で洗い流してください

【包装】

60mL

130mL、300mL（計量カップ添付）