

乾燥性皮膚用薬 ケラチナミン^{コ-ッ}乳状液 10

かゆみを伴う乾燥性皮膚に

エアコンの普及をはじめとする生活環境の変化により、皮膚は乾燥しやすい状態におかれています。それに伴い、皮膚の乾燥によるかゆみで悩む人も、お年寄りをはじめ、お子様や成人層にまで広がってきております。ケラチナミン^{コ-ッ}乳状液10は、こうしたかゆみを伴う乾燥性皮膚にすぐれた効きめをあらわす乳状液タイプの治療薬です。

保湿成分の尿素10%に、かゆみ止め成分のジフェンヒドラミン塩酸塩を同時処方しました。しかも、かゆみに伴い発生しがちな炎症を鎮める成分グリチルレチン酸も配合されています。

お使いになりますと、かゆみが鎮まっていき、カサカサ肌もしっとりしてまいります。

大人はもちろんお子様にもご使用ください。

かゆみを伴う乾燥性皮膚になる要因

- 大気の乾燥
- エアコン・暖房器具の使用による室内の乾燥
- 年齢・体質
- 体の洗いすぎ・こすりすぎ
- 体温の上昇
- 衣類などによる刺激

⚠使用上の注意

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください

- (1)目のまわり、粘膜等。
- (2)きずぐち又は赤くはれているところ。
- (3)ただれやひび割れのひどいところ。

🗨相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1)医師の治療を受けている人。
- (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、刺激感(いたみ、熱感、びりびり感)、はれ、かさぶたの様に皮膚がはがれる状態

3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

かゆみを伴う乾燥性皮膚(成人・老人の乾皮症、小児の乾燥性皮膚)

用法・用量

1日数回適量を患部に塗擦してください。

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児（15歳未満）に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。
- (5) 化粧品ではありませんので、効能・効果で定められた患部のみに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。

成分・分量(100g中)

成 分	分 量	働 き
尿 素	10.0g	体内の水分を皮膚に取りこんで、皮膚をしっとりなめらかにします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	1.0g	かゆみを鎮めます。
グリチルレチン酸	0.3g	皮膚の炎症を鎮めます。

〔添加物〕ワセリン、セタノール、ステアリルアルコール、マクロゴール、ステアリン酸グリセリン、流動パラフィン、カルボキシビニルポリマー、キサンタンガム、スクワラン、ポリソルベート60、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、パラベン、グリシン、リン酸二水素K、水酸化Na

保管及び取扱い上の注意

- (1) 本剤のついた手で、目など粘膜に触れないでください。
- (2) 高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (4) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (5) 使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早く使用してください。



●中味が少なくなった場合は、キャップをしっかりしめた後、図のように容器を倒立にして保管すると出やすくなります。

本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 興 和 株 式 會 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14