

漢方製剤

販売名: ダスモックa

Medicine for Cough and Bronchitis

服用に際して、この説明書きを必ずお読みください。また必要ときに読めるよう大切に保管してください

使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

第2類医薬品

△ 使用上の注意

● 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 胃腸の弱い人
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診察を受けること

症状の名称	症状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄だん（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身ののだるさ、食欲不振等があらわれる
腸間膜静脈硬化症	長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる

- 3ヶ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製品のお問合せは、お買求めのお店又はお客様相談室にお願いいたします

製造販売元 小林製薬株式会社

〒667-0057 大阪府茨木市豊川1-30-3

△ あつらいいいな / をカタチにする

発売元 小林製薬株式会社

〒541-0045 大阪市中央区道修町4-4-10

小林製薬 お客様相談室

0120-5884-01

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

効能・効果

体力中等度で、せきが続く、たんが多くて切れにくいものの次の諸症：たんの多く出るせき、気管支炎

用法・用量

大人(15才以上) 1回1包、1日2回食前又は食間に水又はお湯で服用してください(15才未満は服用しないこと)

＜用法・用量に関連する注意＞

定められた用法・用量を厳守すること

●食間とは「食事と食事の間」を意味し、食後約2~3時間のことをいいます

成分・分量

1日量(2包:6.0g)中
清肺湯エキス 3.2g

オウゴン・キョウソウハクヒ・クニシシ・テンモンドウ・パイモ・チンピ・タイソウ・チクジョ各1.0g、ブクジョウ・ウキ・バクモンドウ各1.5g、ゴミシ・ショウキョウ各0.25g、カンソウ0.5g、より抽出(添加物：デキストリンを含む)

添加物として、ステアリン酸Mg、無水ケイ酸、トメントール、プロピレングリコール、乳糖を含む

気管支炎は喫煙などで慢性化しやすい、呼吸機能を低下させるおそれがあります。

喫煙を控えるなどして健康管理することが重要です。

特徴

- タバコや排気ガスなどで、せき・たんが続く方のお薬です
- 漢方処方「清肺湯(せいはいとう)」が気管支粘膜の汚れを取り除きながら、せき・たんをやわらげます
- 気管支の状態を正常に近づけ、呼吸をラクにしてくれます

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)

●本剤は天然物(生薬)を用いているため、顆粒の色が多少異なることがあります

副作用被害救済制度
☎ 0120-149-931

MADE IN JAPAN