

日本薬局方 第3類医薬品

オリブ油

火気注意

Olive Oil

【使用上の注意】



相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - 湿潤やただれのひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能 効 果】

皮膚の保護、日焼け炎症の防止、やけど、かぶれ

【用 法 用 量】

ガーゼ、脱脂綿等に浸して皮膚（患部）に塗布してください。

＜用法用量に関連する注意＞

- 用法用量を厳守してください。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- 外用にのみ使用してください。

【成 分 分 量】

1 mL中 日局オリブ油 1 mL含有

【保管及び取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 火気に近づけないでください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- 10℃以下で、にごりやかたまりを生じることがありますが、品質に変わりなく、その場合は容器を温湯で温め、溶かしてから使用してください。

＜貯法＞

気密容器。室温保存。

【包

装】

50 mL、100 mL、500 mL