

2017年10月作成

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

鎮痛消炎プラスター剤

パスタイム[®] FXこはる

【特長】

- 有効成分としてフェルビナクを5%、冷感刺激成分のトメントール4.2%、血行促進作用のあるトコフェロール酢酸エステル2.3%の3種を配合した鎮痛消炎プラスター剤です。
- フェルビナクは痛みに関する物質（プロスタグランジン）の生成を抑え、肩・腰・関節・筋肉の痛みにすぐれた効き目をあらわします。
- 片手でも貼りやすい手のひらサイズです。
- ハーブ系の香料としてラベンダー油、柑橘系の香料としてベルガモット油、オレンジ油を配合しています。
- 基布はコシのあるものを使用し、貼りやすくお肌によくフィットします。

⚠ 【使用上の注意】

☒ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります]

1. 次の人は使用しないでください。

- 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状（発疹・発赤、かゆみ、かられ等）を起こしたことがある人
- ぜんそくを起こしたことがある人
- 妊娠又は妊娠していると思われる人
- 15歳未満の小児

2. 次の部位には使用しないでください。

- 目の周囲、粘膜等
- 湿疹、かられ、傷口
- みすむし・たむし等又は化膿している患部

3. 連続して2週間以上使用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- 医師の治療を受けている人
- 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かられ、水疱

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
ショック（アナフィラキシー）	使用後すぐに、皮ふのかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎（手・手首・足首の痛みと腫れ）、肘の痛み（テニス肘など）、打撲、捻挫

【用法・用量】表面のライナーをはがし、1日2回を限度として患部に貼付する。

用法・用量に関する注意

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
- (3) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
- (4) 皮ふの弱い人は、使用前に腕の内側の皮ふの弱い箇所に、1~2cm 角の小片を目安として半日以上はり、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。

【成分・分量】膏体 100g (1.0m²) 中

フェルビナク	5.0g
メントール	4.2g
トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE)	2.3g
添加物として流動パラフィン、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリイソブチレン、テルペン樹脂、香料、その他2成分を含有します。	

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包装】5.5cm×7.2cm 20枚(10枚/袋×2袋), 40枚(10枚/袋×4袋)

製造販売元 ◎祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地1

日本製 [お客様相談窓口] TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00~17:00 (土,日,祝日は除く)

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

0120-149-931