

飲み方を厳守して下さい。
小児に服用させる場合
には、保護者の指導監
督のもとに服用させて
下さい。

開け口
▼

8~14歳用

お子様の貧血に マスチゲン錠

MASTIGEN® TABLET



飲み方は1日1錠

吸収のよい

鉄分

鉄の吸収を高める
ビタミンC

赤血球を守る
ビタミンE

第2類医薬品

⚠ 使用上の注意

してはいけないこと ❌ 守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起きやすくなります。本剤を服用している間は、他の貧血用薬を服用しないで下さい。

相談すること 🏠 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(1)医師の治療を受けている人。(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振、胃部不快感、腹痛

3. 服用後、便秘、下痢があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

製造販売元

日本臓器製薬株式会社

大阪市中央区平野町2丁目1番2号

お客様相談窓口 ☎06・6222・0441

土・日・祝日を除く 9:00~17:00

副作用被害救済制度 ☎0120・149・931

ご使用に際して、この箱の説明文書をお読み下さい。必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

【効能】貧血

【飲み方】8歳以上15歳未満、**1日1回1錠**、食後に飲んで下さい。朝昼晚いつ飲んでも構いません。8歳未満は服用しないで下さい。

【特長】

- 1.貧血を治す鉄分配合により、1日1錠、2～3週間の服用で貧血への効果が期待できます。
- 2.配合の鉄分は体内での吸収がよく、成長期のお子様の貧血を治します。
- 3.烏レバー56gまたはホウレン草250g中に含まれる鉄分と同量の鉄分5mgを1錠中に配合しています。
- 4.鉄分の吸収を高めるレモン約2個分のビタミンC、赤血球を守るビタミンE、赤血球を造るビタミンB₁₂、葉酸を配合。
- 5.思春期のお嬢様の貧血に有効です。
- 6.お子様にも飲みやすい小さな錠剤です。

【飲み方に関連する注意】(1)貧血症状が少しでも改善された方は、その後も根気よく服用して下さい。詳しくは、薬剤師・登録販売者にご相談下さい。(2)本剤の服用前後30分は、玉露・煎茶・コーヒー・紅茶は飲まないで下さい。ほうじ茶・番茶・ウーロン茶・玄米茶・麦茶はさしつかえありません。(3)2週間ほど服用されても症状が改善しない場合、他に原因があるか、他の疾患が考えられます。服用を中止し、医師・薬剤師・登録販売者にご相談下さい。

【成分】1錠中

溶性ピロリン酸第二鉄 …… 39.75mg
(鉄として5mg)
ビタミンC …… 33.3mg
ビタミンE酢酸エステル …… 6.7mg
ビタミンB₁₂ …… 25μg
葉酸 …… 500μg

添加物：ラウリン酸ソルビタン、ゼラチン、白糖、タルク、グリセリン脂肪酸エステル、二酸化ケイ素、セルロース、乳糖、無水ケイ酸、ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、クロスボドン、ヒプロメロースフタル酸エステル、クエン酸トリエチル、ヒプロメロース、酸化チタン、マクロゴール、カルナウパロウ、赤色102号

【成分に関連する注意】

配合されている溶性ピロリン酸第二鉄により**便秘になったり便が黒くなる**ことがあります。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。(2)小児の手の届かない所に保管して下さい。(3)他の容器に入れ替えないで下さい。誤用の原因になったり品質が変わることがあります。(4)錠剤の色が落ちることがありますので、濡れた手で錠剤を触らないで下さい。手に触れた錠剤は、容器に戻さないで下さい。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。(6)容器内に乾燥剤が入っています。誤って服用しないで下さい。