

**第3類医薬品** 収斂消炎剤  
日本薬局方  
**チenk油**  
Zinc Oxide Oil 50g  
チenk油「コサカイ・P」



発売元  
大洋製薬株式会社  
東京都文京区本郷3-14-16  
製造販売元  
小堺製薬株式会社  
東京都墨田区両国4-36-9

2012年4月改訂(記載要領変更に伴う改訂等)  
ご使用前に際しては、この説明文書を必ずお読み下さい。  
また必要な時に読めるよう大切に保管してください。

**△ 使用上の注意**

**☒ | してはいけないこと**

〔守らないと現在の症状が悪化したり副作用が起ります〕  
1.次の部位には使用しないでください。  
重複又は広範囲のやけど

**■ | 相談すること**

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1) 医師の治療を受けている人  
(2) どうどくアレルギー症状を起こしたことがある人

(3) 無理が並範囲の人  
(4) 連用やただれのひどい人

2.使用後、次の症状があわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

**関係部位**      **症 状**

皮 膚 発疹・発赤・かゆみ等

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

使用期限 :

製造番号 :

**第3類医薬品**

日本薬局方  
**チenk油**  
Zinc Oxide Oil

**効能・効果**

小範囲の湿疹、皮膚炎、やけどによる潮紅

**用法・用量**

1日1~数回、適量を直接患部に塗布する。

**【上手なつかい方】**

本剤を塗布した後はガーゼ等で覆ってください。必ずオリーブ油等で前回のチenk油をふき取ってからつけ直すようにします。オリーブ油でふき取れないよううなびらん、潰瘍、熱傷には使用できませんのでご注意ください。

大洋製薬お客様相談窓口

○○○120-184328

受付時間 午前10時~午後5時(土・日曜、祝日は除く)

副作用被害救済制度

○○120-149-931

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い流してください。なお、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- (3) 外用にのみ使用し、内服しないでください。
- (4) 油分が分離していることがありますので、よくかき混ぜて均一にしてからご使用ください。

**成分**

本品50g中、酸化亜鉛25gを含有します。  
添加物としてポリオキシエチレンソルビタン  
脂肪酸エチル、ダイヤス油を含有します

**保管及び取扱い上の注意**

- (1) 直射日光の当たらない、涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかねないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるものがあります。)
- (4) 使い期限を過ぎた製品は使用しないでください。

E12-TS

