

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

1601-AHI

アレルギー性鼻炎、急性鼻炎などによる

点鼻スプレー

# 鼻づまり・鼻みずには ハナスキット鼻炎スプレー

第2類医薬品

急性鼻炎やアレルギー性鼻炎は鼻づまり、鼻みずやくしゃみなどの不快な症状の原因となります。

本品はスプレー式ですので、有効成分を鼻腔内に霧状に噴霧して鼻粘膜の炎症をおさえ不快な症状を改善します。

## ⚠ 使用上の注意

### してはいけないこと



(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
長期運用しないでください

### 相談すること



1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。

高血圧、心臓病、糖尿病、甲状腺機能障害、緑内障

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
鼻	はれ、刺激感

3.3日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

### 《効能・効果》

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：鼻づまり、鼻水（鼻汁過多）、くしゃみ、頭重（頭が重い）

### 《用法・用量》

成人（15歳以上）及び7歳以上の小児：1回に1～2度ずつ、1日1～5回、鼻腔内に噴霧してください。なお、適用間隔は3時間以上おいてください。

## 使用方法



キャップをとります。



容器をもち、液が噴霧するまで、はね部を2~3回押してください。



静かに息を吸い込みながら、鼻腔内に噴霧してください。



〔液が残っている音はするが出ない時〕  
液を吸い上げるチューブは右図のような構造になっています。  
緩やかなカーブがついていますので容器をかたむけずお使い頂くと、むだなくお使いいただけます。

- 容器を横にして使用すると、薬液が霧状になりませんので、必ず上向きにして使用してください。
- 使用後は先端部分を清潔なティッシュペーパー等で拭き取り、キャップをしてください。
- ノズルの先端を針等で突くのは折れた時大変危険ですのでおやめください。

### 《用法・用量に関する注意》

- (1) 用法・用量を守ってください。
- (2) 過度に使用すると、かえって鼻づまりを起こすことがあります。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 点鼻用にのみ使用し、内服しないでください。

### 《成分・分量》

成 分	分量(100mL)中	作 用
ナファゾリン塩酸塩	50mg	鼻粘膜の血管を収縮させ、はれ、充血をおさえて、鼻づまりを改善します。
クロルフェニラミン マレイン酸塩	500mg	抗ヒスタミン作用により、鼻みずの分泌過多をなくします。
ベンゼトニウム塩化物	20mg	鼻粘膜を殺菌・消毒します。

添加物：グリセリン、エタノール、pH調節剤、香料

### 《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、期限内であっても、開封後は品質保持の点からなるべく早くご使用ください。

本剤についてのお問い合わせは、  
お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

株式会社タカミツ

☎ 0120-459533

受付時間

(9:00~12:00、13:00~17:00  
土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独) 医薬品医療機器総合機構  
☎ 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元

株式会社タカミツ

〒462-0803 名古屋市北区上飯田東町4-68-1