

この箱は本剤とともに保管し、使用の際にはよくお読みください。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

1. 次の人は使用しないでください。

- (1) 出血性血液疾患(血友病、血小板減少症、紫斑病など)の人
- (2) わずかな出血でも重大な結果をきたすことが予想される人(血液凝固抑制作用を有し出血を助長するおそれがあります)

2. 次の部位には使用しないでください。

目や目の周囲、粘膜(口腔、鼻腔、膈など)

🗨 相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、紫斑

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

ヘパリン類似物質0.3%配合

ヘパドロイド

油性クリーム

乾燥肌を保湿・改善し 肌本来のうるおいへ

保湿 抗炎症 血行促進

●ヘパリン類似物質0.3%配合


高い水分保持力でしっかり保湿し、荒れた皮ふ症状を鎮め、皮ふの再生を促進します。

●油性クリーム(w/o型)

皮ふ表面をしっかりとかバーし、水をはじいて患部を保護します。べたつかず、しっとり肌になじみます。

●赤ちゃんや敏感肌にも

無香料・無着色、ステロイドフリー、エタノールフリーの保湿クリームです。



※ 赤ちゃんにもご使用いただけますが、子どもの皮ふは大人より敏感ですので、生後6ヶ月を目安に、様子を見ながらご使用ください。

※ 出血のある傷口には使用しないでください(血が止まりにくくなる可能性があります)。

※ 顔面にある傷あと・やけどのあと、かさぶたには使用しないでください。

発売元 **A 株式会社 浅田 豊**
東京都東村山市久米川5-29-7

●お問合せ先 お客様相談室
電話 03-3953-4044
時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元 ジャパンメディック株式会社
富山県富山市横越168

第2類医薬品

【効能・効果】

手指の荒れ、ひび・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、手足のひび・あかざれ、乾皮症、小児の乾燥性皮ふ、しもやけ(ただれを除く)、きず・やけどのあとの皮ふのしこり・つっぱり(顔面を除く)、打身・ねんざ後のはれ・筋肉痛・関節痛

【用法・用量】

1日1～数回、適量を患部に擦り込むか、またはガーゼ等のにばして貼ってください。

●定められた用法、用量を厳守してください。

●小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

●目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には医師の診療を受けてください。

●外用にのみ使用してください。

【成分・分量】100g中

ヘパリン類似物質………0.3g
添加物: グリセリン、スクワラン、流動パラフィン、ワセリン、セリン、サラシミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル、ポリオキシエチレンオレイルエーテル、硫酸Mg、パラベン

【保管及び取扱上の注意】

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変化します)。

(4) 使用期限を過ぎた製品は、使用しないでください。

乾燥性皮膚用薬