

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

第2類医薬品

花粉による鼻づまり、鼻水、くしゃみに

エージアレルカットEXc<季節性アレルギー専用>
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)0.1%配合点鼻薬

エージアレルカットEXc<季節性アレルギー専用>の特徴

- 1. 抗炎症作用と抗アレルギー作用を併せ持つ「ベクロメタゾンプロピオン酸エステル」が、鼻粘膜にダイレクトに作用し、花粉によるつらい鼻づまりや鼻水、くしゃみをおさえます。
- 2. 朝の使用で夕方まで、夕方の使用で朝まで効果が続く点鼻薬です。(通常1日2回使用した場合)
- 3. スーッとした清涼感があり、患部に留まり液ダレしにくい、モイストタイプの点鼻薬です。
- 4. あらゆる角度から噴霧可能で、最後まで使いきれのるスプレー容器を使用しています。
- 5. 鼻炎用内服薬や点眼薬と同時にお使いいただけます。

使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 1. 次の人は使用しないで下さい。
 - (1) 次の診断を受けた人
全身の真菌症、結核性疾患、高血圧、糖尿病、反復性鼻出血、ぜんそく、緑内障、感染症
 - (2) 鼻孔が化膿(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)している人
 - (3) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4) 18歳未満の人
 - (5) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (6) ステロイド点鼻薬を過去1年間のうち3カ月以上使用した人
- 2. 本剤は、他のステロイド点鼻薬の使用期間も合わせて、1年間に3カ月を超えて使用しないで下さい。(3カ月を超えた使用が必要な場合には、他の疾患の可能性があり
ますので耳鼻咽喉科専門医に相談して下さい)
- 3. 本剤の使用後は、ステロイド点鼻薬を使用しないで下さい。ただし、医師から処方された場合は、その指示に従って下さい。



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 減感作療法等、アレルギーの治療を受けている人
 - (3) 頭、額や頬などに痛みがあり、黄色や緑色などの鼻汁のある人(感染性副鼻腔炎)
 - (4) 授乳中の人
 - (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (6) 季節性アレルギーによる症状か他の原因による症状かはっきりしない人
 - (7) 高齢者
 - (8) 肥厚性鼻炎※1や鼻たけ(鼻ポリープ)※2の人
※1:鼻のまわりが重苦しく、少量の粘液性又は黄色や緑色の鼻汁がでる。
※2:鼻づまり、鼻声、鼻の奥の異物感などがある。
 - (9) 長期又は大量の全身性ステロイド療法を受けている人
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
鼻	鼻出血、鼻の中のかさぶた、刺激感、かゆみ、乾燥感、不快感、くしゃみの発作、嗅覚異常、化膿症状(毛根の感染によって、膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
のど	刺激感、異物感、化膿症状(感染によって、のどの奥に白っぽい膿(うみ)がたまり、痛みやはれを伴う)
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
精神神経系	頭痛、めまい
消化器	吐き気・嘔吐、下痢、食欲不振
その他	ぜんそくの発現、目の痛み、目のかすみ、動悸、血圧上昇

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

(裏面に続く)

3. 使用後、頭、額や頬などに痛みがでたり、鼻汁が黄色や緑色などを呈し、通常と異なる症状があらわれた場合は直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。(他の疾患が併発していることがあります)
4. 1週間位(1日最大4回(8噴霧)まで)使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

効 能・効 果

花粉による季節性アレルギーの次のような症状の緩和：鼻づまり、鼻みず(鼻汁過多)、くしゃみ

使 用 法

年 齢	1 回 量	1日使用回数
成人(18歳以上)	左右の鼻腔内にそれぞれ1噴霧ずつ	通常2回(朝・夕)
18 歳 未 満	使用しないで下さい。	
1日最大4回(8噴霧)まで使用してもかまいませんが、使用間隔は3時間以上おいて下さい。 ●症状が改善すれば使用回数を減らして下さい。 症状が再び悪化した場合は、使用回数を増やしてもかまいません。 ●1年間に3カ月を超えて使用しないで下さい。		

〈使用法に関連する注意〉

- (1) 本剤は、ベクロメタゾンプロピオン酸エステル(ステロイド)を配合していますので、過量に使用したり、間違った使用法で使用すると、副作用が起こりやすくなる場合がありますので、定められた使用法を厳守して下さい。
- (2) 点鼻用にのみ使用して下さい。
- (3) 使用時に味がした場合には、口をゆすいで下さい。

〈使用方法〉

① 鼻孔が化膿している人は使用できません。	② 使用前にやさしく鼻をかんで下さい。(あまりきつくかまないで下さい)	③ 青いキャップをはずして、図のように容器を持って下さい。(使い始めは、薬液が噴霧するまで数回、空押しして下さい)	④ ノズルの先を軽く鼻腔内に入れ、1回に1度ずつ薬液を噴霧して下さい。もう一方の鼻腔でも同じ操作を繰り返して下さい。	⑤ 使用後はノズル付近を清潔なティッシュペーパー等でふいて、キャップを閉めて下さい。
-------------------------------------	---	---	--	--

- 〈使用にあたっての注意〉 (1) 使用前には鼻をかみ、鼻腔のとおりをよくしておいて下さい。
- (2) 容器の先が鼻汁などに触れると、薬液が汚染されることがありますので注意して下さい。
- (3) ノズルが鼻中隔※に向かないよう、鼻腔内にまっすぐ入れて噴霧して下さい。特に右利きの方では右の鼻中隔に、左利きの方は左の鼻中隔に向きやすいため注意して下さい。
- ※鼻中隔：鼻の穴の中にある鼻腔を左右に仕切る隔壁
- (4) 使用後はノズル付近をティッシュペーパー等でふいて、清潔に保って下さい。
- (5) ノズルの先端を針などで突くのは、折れたとき大変危険ですので、絶対におやめ下さい。

成 分・分 量

本剤は、白色懸濁性の粘稠な液で、100g中に次の成分を含有しています。

成 分	分 量	はたらき
ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0.1g	鼻粘膜に作用して、鼻づまり・鼻水等をおさえます。

添加物：カルボキシビニルポリマー、L-アルギニン、エタノール、等張化剤、ベンザルコニウム塩化物、エデト酸Na、ハッカ油、l-メントール、ポリソルベート80、pH調節剤

〈成分・分量に関連する注意〉 本剤はアルコールを含んでいますので、しめることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わります)
- (4) 他の人と共用しないで下さい。
- (5) 表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。また、使用期限内であっても、開封後は、速やかに使用して下さい。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電 話 0120-337-336

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

<https://www.daiichisankyo-hc.co.jp/>

01®登録商標