

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。また、必要なときには簡単に取り出せるように大切に保管してください。



日本薬局方 フェルビナクパップ
フェイタスシップ®
フェルビナク配合シップ剤 (販売名)



16枚入 第2類医薬品
サイズ:10cm×14cm (8枚/1袋×2袋)
保湿チャック付

詳しい情報は
こちらへ。

微香性

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】

- [守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。]
1. 次の人は使用しないでください。
(1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2) ぜんそくを起こしたことがある人。(3) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(4) 15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。(3) みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 連続して2週間以上使用しないでください。

【相談すること】

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ、ヒリヒリ感、かぶれ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれます。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

効能・効果

肩こりに伴う肩の痛み、腰痛、関節痛、筋肉痛、腱鞘炎(手・手首・足首の痛みとはれ)、肘の痛み(テニス肘など)、打撲、ねんざ

用法・用量

1日2回を限度として、患部に貼ってください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 15歳未満の小児に使用させないでください。
(2) 定められた用法・用量を守ってください。
(3) 本剤は、痛みやはれ等の原因になっている病気を治療するのではなく、痛みやはれ等の症状のみを治療する薬剤なので、症状がある場合だけ使用してください。
(4) 患部の皮膚は清潔にして貼ってください。

成分・分量

成分含量(膏体100g中)

フェルビナク 0.7g
添加物として、エデト酸Na、N-メチル-2-ピロリドン、l-メントール、グリセリン、ケイ酸Al、酸化チタン、酒石酸、ゼラチン、ポリアクリル酸部分中和物、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、メタケイ酸アルミニウムMg、その他3成分を含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光や高温を避け、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2) 小児の手の届かない所に保管してください。
(3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります)。
(4) 使用期限を過ぎた商品は使用しないでください。
(5) 開封後はチャックをしっかりと閉めて保管してください。



▼本商品についてのお問い合わせは、お買い求めの薬局・薬店、又は下記の「お客様相談室」までお願い申し上げます。

製造販売元 久光製薬株式会社 〒841-0017 鳥栖市田代大官町408番地 <http://www.hisamitsu.co.jp>

お客様相談室: ☎ 0120-133250 受付時間 / 9:00-17:50 (土日・祝日・会社休日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 : (独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html ☎ 0120-149-931



16枚入 (8枚/1袋×2袋)
サイズ:10cm×14cm

16枚入

フェイタスシップ®

第2類医薬品



第2類医薬品
微香性

肩こり・筋肉疲労
冷感

16枚入

フェイタスシップ®

10cm×14cm
大判ホット

製造
販売
期限

冷感

フェイタスシップ®
16枚入

サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

第2類医薬品
フェイタスシップ®
冷感

16枚入
サイズ:10cm×14cm
(8枚/1袋×2袋)

16枚入

16枚入

フェイタスシップ®

第2類医薬品
微香性

第2類医薬品