

使用に当たって、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

第2類医薬品

かぜ内服液W「小児用」

かぜ薬

かぜの引きはじめにすぐれた効きめをあらわす漢方薬成分の「葛根湯エキス」に、発熱・のどの痛み・せきなどの諸症状をやわらげる成分を配合したお子様用のかぜ薬です。

⚠使用上の注意

（本剤は、小児用ですが、かぜ薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。）

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2) 本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください（眠気等があらわれることがあります。）

4. 服用前後は飲酒しないでください

5. 長期連用しないでください



■ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(4) 次の症状のある人。 高熱、排尿困難
(5) 次の診断を受けた人。 心臓病、肝臓病、腎臓病、胃・十二指腸潰瘍、緑内障

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
呼吸器	息切れ、息苦しさ
泌尿器	排尿困難
その他	過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群 (スティーブンス・ジョンソン症候群) 中毒性表皮壊死融解症 急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
薬剤性過敏症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、股の付け根等）のはれ等があらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸（皮膚や白目が黄色くなる）、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。
腎障害	発熱、発疹、尿量の減少、全身のむくみ、全身のだるさ、関節痛（節々が痛む）、下痢等があらわれる。
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
ぜんそく	息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらくらとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

（裏面もお読みください。）

富山スガキ株式会社

初校	23.01.25	営業	柳野	品名	(本草)かぜ内服液W「小児用」能書			
受注番号	0934-22-0920	制作	江尻	刷色				
商品ID	0057-7345	校正	奥井	色名	K			

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気
4. 5～6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

かぜの諸症状（鼻水、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、悪寒、発熱、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み）の緩和

【用法・用量】

次の1回量を1日3回食後なるべく30分以内、および必要な場合には就寝前に服用します。なお、場合により約4時間毎に1日6回まで服用することができます。

年 齢	1回量
3歳以上7歳未満	4mL
1歳以上3歳未満	3mL
6ヵ月以上1歳未満	2.4mL
3ヵ月以上6ヵ月未満	2mL

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
(2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
(3)2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

【成分・分量】（24mL中）

アセトアミノフェン.....150mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩.....2mg
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物.....16mg
無水カフェイン.....32mg
葛根湯エキス.....1,375mg
（カッコン1,325mg、マオウ662.5mg、タイソウ662.5mg、ケイヒ497mg、シャクヤク497mg、カンゾウ331.5mg、ショウキョウ166mgより製した軟エキス）

添加物として、白糖、D-ソルビトル、クエン酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、安息香酸Na、パラベン、アルコール、プロピレングリコール、香料を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
(4)計量カップは、使用后、水洗いなどして清潔に保管してください。
(5)開栓後は、冷蔵庫に入れて、なるべく早く服用してください。
(6)本剤には生薬エキスが配合されているため、沈殿を生じることがありますが、効果に変わりはありません。よく振ってから服用してください。
(7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
（独）医薬品医療機器総合機構
☎0120-149-931（フリーダイヤル）

【お問い合わせ先】

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、又は下記までご連絡いただけますようお願い申し上げます。
本草製薬株式会社 お客様相談室
〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地
電 話：052-892-1287（代表）
受付時間：午前9時～午後5時（土、日、祝日を除く）

発 売 元 製造販売元
本 草 製 薬 株 式 有 限 公 司 大 生 堂 薬 品 工 業 株 式 有 限 公 司
名古屋市天白区古川町125番地 岐阜市六条大溝3丁目3番17号

富山スガキ株式会社

初校	23.01.25	営業	柳野	品名	(本草)かぜ内服液W「小児用」能書			
受注番号	0934-22-0920	制作	江尻	刷色				
商品ID	0057-7345	校正	奥井	色名	K			