

あけくち

日本薬局方

ジュウヤク

販売名 山本漢方 どくだみ「分包」

【特徴】本品は生薬の煎じ薬（ティーバッグタイプ）です。

△ 使用上の注意

⊗ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください

他の瀉下薬（下剤）

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 次の症状のある人。

はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
消化器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢

4. 1ヵ月位（便秘、便秘に伴う吹出物に服用する場合は5～6日間）服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

製造販売元

🏢 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

電 話 0568-73-3131

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

http://www.kanpo-yamamoto.com

副作用被害救済制度 ☎ 0120(149)931

ご使用に際して、この説明文を必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第3類医薬品

効能又は効果

便秘、便秘に伴う吹出物、尿量減少

用法及び用量

年 齢	1回量	服用回数
大人 (15歳以上)	1包(5g)	1日3回を限度とする。

大人(15歳以上)は、1回1包を水約200mLをもって煮て、約130mLに煮つめ、滓(カス)をこして取り去り、食前又は食間に1日3回服用する。

〈注意〉

定められた用法及び用量を厳守してください。

成分及び分量 1日量 3包(15g)中

成 分	分 量	作 用
日本薬局方 ジュウヤク	15g	便秘薬とし、あるいは利尿の目的で煎用する。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【内 容 量】120g (5g×24包)

【その他】

○ジュウヤクの煎じ方(大人15歳以上)

土ビンかヤカン(アルミ、ステンレス製)にて水約200mLの中に本品1包を入れ、中の煎剤が軽く泡立つ程度の弱火にて、水が約130mLとなるまで(10～15分)煎じて、火を止め袋を取り出ししてください。

本品1回分の煎じ方です。

1日3回(朝・昼・夜)、同様の煎じ方でそのつど約130mLを煎じだし、服用してください。

○本品を煎じた後の保管

夏期は、長時間煎液を放置しますと、腐敗する恐れもありますので、煎液は冷蔵庫に保管してください。