



区分	第3類医薬品
薬効分類	外用鎮痛消炎薬
剤形	ブラスター剤
包装規格	25 枚
備考	

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。）

- 1. 次の人は使用しないこと
天然ゴムによるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 次の部位には使用しないこと
(1) 目の周囲、粘膜等。(2) 湿疹、かぶれ、傷口。

相談すること

- 1. 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 3. 5～6日間使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

【効能効果】

肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、しもやけ、骨折痛

【用法用量】

1日1～2回、ライナーをはがし、患部に貼ってください。

<用法用量に関連する注意>

- (1) 用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。
- (4) 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- (5) 本剤を貼ってから汗をかくと強い刺激を感じるため、汗をかきそうな作業やスポーツを行う前には使用しないでください。
- (6) 皮膚の弱い人は、使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1～2cm角の薄片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。
- (7) 貼ったままあるいははがした直後に入浴すると強い刺激を感じるため、1時間以上前にはがして入浴してください。また、入浴後30分位してから使用してください。

【成分分量】

膏体100g中	
サリチル酸グリコール	5.597g
メントール	3.148g
ノニル酸ワニリルアミド	0.021g

添加物として、ポリブテン、生ゴム、ポリイソブチレン、エステルガム、テルペン樹脂、沈降炭酸カルシウム、酸化チタン、アクリル酸メチル・アクリル酸-2-エチルヘキシル共重合樹脂、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル、天然ゴムラテックス、赤色405号、香料を含有します。

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 開封後は未使用分を袋に入れチャックを閉め、箱に入れて保管してください。
- (5) 使用期限の過ぎた製品は使用しないでください。