

使用に際してはこの説明書をよく読み、本剤とともに保管してください。

第2類医薬品

口腔咽喉薬

ピタスせきトローチ

■特徴

口腔内殺菌成分・セチルピリジニウム塩化物水和物を配合しており、のどの炎症によるのどの痛み・はれを抑えます。●鎮咳成分・フェノールフタリン酸デキストロメトルファンが咳中枢にはたらい、つらい咳を抑えます。

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないこと

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 本剤を使用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないこと

他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬等）

相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。高熱

2. 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	皮膚	消化器	精神神経系	呼吸器
症状	発疹・発赤、かゆみ	吐き気・嘔吐、食欲不振	めまい	息苦しさ、息切れ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
ショック (アナフィラキシー)	使用后すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5～6回使用しても症状がよくなる場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

■効能・効果

せき、たん、のどの炎症によるのどの痛み・のどのはれ・のどのあれ・のどの不快感・声がれ

■用法・用量

次の量を口中に含み、かまずにゆっくり溶かして使用すること。

年齢	1回量	1日使用回数	使用間隔
成人（15歳以上）	1個	6回	2時間以上
15歳未満	使用しないこと。		

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守すること。
- (2) かんだり、のみこんだりしないこと。

■成分 6個（1日使用量）中

成分	含量
フェノールフタリン酸デキストロメトर्फアン	60mg
グアヤコールスルホン酸カリウム	140mg
セチルピリジニウム塩化物水和物	6mg

添加物：ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドン、プルラン、マクロゴール、/ーメントール、タンニン酸、D-ソルビトール、サッカリンNa、シヨ糖脂肪酸エステル、スクラロース、銅クロロフィリンNa、香料

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質が変わる）。
- (4) アルミ袋開封後はすみやかに使用すること。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。

■包装

12個入り

■お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

連絡先 大鵬薬品工業株式会社 お客様相談室

〒101-8444 東京都千代田区神田錦町 1-27

電話番号 03-3293-4509

受付時間 9:00~17:30（土、日、祝日を除く）

販売元

大鵬薬品工業株式会社

東京都千代田区神田錦町 1-27

<https://www.taiho.co.jp/>

製造販売元

救急薬品工業株式会社

富山県射水市戸破 32-7