

ご使用前に、この箱の説明文をお読みください。
また必要な時に読めるように保管してください。

平成 29 年 3 月作成

第 2 類医薬品

コトブキ浣腸ひとおし 40

(情報は小箱に直接記載)

[使用上の注意]

してはいけないこと

連用しないこと (常用すると、効果が減弱し (いわゆる “なれ” が生じ) 薬剤にたよりがちになる。)



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。)
- (3) 高齢者。
- (4) はげしい腹痛、吐き気・嘔吐、痔出血のある人。
- (5) 心臓病の診断を受けた人。

2. 2～3回使用しても排便がない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること



その他の注意

次の症状があらわれることがある

立ちくらみ、肛門部の熱感、不快感

[効能・効果] 便秘

[用法・用量]

12歳以上1回1個(40g)を直腸内に注入します。
それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守すること。
- (2) 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんすること。
(使用後、すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがある。)
- (3) 12歳未満の小児には使用させないこと。
- (4) 浣腸にのみ使用すること。
- (5) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意してください。
- (6) 冬季は容器を温湯(40℃)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。

【使用方法】

- ① 容器を持ち、キャップを回しながら外してください。
- ② 挿入部に傷等がないか確かめて、肛門部へ挿入し、容器を静かに押しつぶしながら、ゆっくりと薬液を注入してください。
- ③ 薬液注入後、2～5分がまんして十分便意が強まってから排便してください。
挿入部分が長く（当社比）容器は押しつぶしやすいジャバラ型ですので、力の弱いお年寄りの方にも、より使いやすくなりました。



滑らかに挿入できない場合は、薬液を少し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

【便秘しがちな方のために】

1. 規則的な排便の習慣をつけることが大切で、毎日時間を決めて一定時間トイレに入るよう心がけてください。
また、便意をもよおした時は、がまんせずトイレに行ってください。
2. 繊維質の多い食べ物と水分を多くとるように心がけてください。
(例：野菜類・果物・コンニャク・カンテン・海藻等)
3. 適度な運動、腹部マッサージなどを行うよう心がけてください。
4. 早朝、起きがけに冷たい水又は牛乳等を飲むと便意をもよおしやすくなります。

【成分・分量】本品1個（40g中）

日局 グリセリン・・・・・・・・・・20.0g
添加物として ベンザルコニウム塩化物含有
溶剤として精製水

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと。
(誤用の原因になったり品質が変わる。)

【包装】40g×2個入、40g×10個入

お問合せ先 ムネ製薬株式会社 お客様相談室
電話番号：0120-85-0107
受付時間：8：30～17：00（土日祝を除く）

製造販売元  ムネ製薬株式会社

兵庫県淡路市尾崎 859

<http://www.mune-seiyaku.co.jp>

(独)医薬品医療機器総合機構
副作用被害救済制度
☎0120-149-931