ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。また、必要な時に読めるよう大切に保管して下さい。

内服用男性ホルモン剤

第1類医薬品

# 強力儿口木人內服液

本剤には、内服用男性ホルモン剤のメチルテストステロンを配合してあります。他に、強壮生薬のニンジン、イカリソウ並びに、代謝に働くビタミンB<sub>1</sub>・B<sub>2</sub>及びグルクロノラクトン、カフェインを配合しておりますので下記効能にすぐれた効果をあらわします。

## 使用上の注意 /

### しではいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)

- 1. 次の人は服用しないで下さい
  - (1)アンドロゲン依存性悪性腫瘍 (前立腺がん、男子乳がん)及びその疑いのある人。
  - (2)肝臓に障害のある人。
  - (3)妊婦又は妊娠していると思われる人。 (女性胎児の男性化が起こることがあります。)
  - (4)女性及び乳・幼・小児。

(女性の服用により嗄声、多毛、座瘡、色素沈着、月経異常、 陰核肥大、性欲亢進が起こることがあります。また乳・幼 ・小児の服用により骨端の早期閉鎖、性的早熟が起こるこ とがあります。)

- 2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないで下さい (眠気等があらわれることがあります。)
- 3. 長期連用しないで下さい

(本剤の大量継続服用により<u>精巣</u>萎縮、精子減少、精液減少 等の精巣機能抑制があらわれることがあります。)

## 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談して下さい
  - (1)前立腺肥大のある人。
  - (2)心臓疾患、腎臓疾患、がんの骨転移のある人。 (本剤の服用により水・ナトリウムの体内貯留、高カルシウム血症があらわれることがあります。)
  - (3)高齢者。
  - (4)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談して下さい

関	係	部	位	症 状
	皮	膚		発疹・発赤、かゆみ
	消	化 器		吐き気・嘔吐、食欲不振

#### 〔効 能・効 果〕

男性ホルモン分泌不足、分泌障害による諸症(更年期及び更年期 以後に於ける次の諸症。勃起力減退・性感減退・性欲欠乏・神経 衰弱性陰萎・衰弱性射精・老衰性陰萎。)

#### 〔用 法・用 量〕

本剤は男性用です。1日1回夕食後に服用して下さい。症状に応 じて1日2回朝・夕食後に服用して下さい。

年 齢	1 回 量
大人(15才以上)	1アンプル (10mL)
15才未満	服用しないこと

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)定められた用法、用量を厳守して下さい。
- (2)内服にのみ使用して下さい。

#### 〔成 分・分 量〕

成 分	1 アンプル10mL中
メチルテストステロン	15.0mg
イカリソウエキス (イカリソウとして300mg)	30.0mg
ニンジンエキス (ニンジンとして470mg)	42.3mg
チアミン塩化物塩酸塩(ビタミンB1)	10.0mg
リボフラビン (ビタミンB2)	0.5mg
グルクロノラクトン	5.0mg
カフェイン水和物	20.0mg

添加物としてエタノール、クエン酸、Dーソルビトール、香料、マクロゴール、 白糖を含有する。

〈成分・分量に関連する注意〉

ビタミンB2により尿が黄色になることがあります。


#### [保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2)小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。
- (5)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈でんを生じることが ありますが薬効には変わりありません。よく振ってから服 用して下さい。

#### 注意事項

- 1) 本剤は内服にのみ使用し、注射等に用いないで下さい。
- 2) 開封の際は、添付のアンプルカバーを使用して下さい。
- 3)服用に際しては、添付のストローを使用して下さい。
- (4)服用後のアンプルは、適正な場所に廃棄して下さい。
- [ 5) 開封方法

アンプルカバーの上から図の部分をつまみ、ケガ等 をしないよう、手指に注意しながらアンプルをカッ トして下さい。



本製品内容についてのお問い合せは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

消費者相談窓口 日新製薬株式会社

TEL0120-967-862 FAX0748-62-3417 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

## **メイクトモロ-**のホームページ

副作用救済制度 20120-149-931

http://www.maketmr.co.jp

お客様相談室(平日(月~金)10:00~17:00)

0120-226-028

フリーダイヤル .

発 売 元



## 株式會社メイクトモロー

〒541-0045 大阪市中央区道修町1丁目3番7号 製造販売元

日新製薬株式会社

〒528-0013 滋賀県甲賀市水口町宮の前2-62

H268R

A08