

この説明書は、お薬とともに保管し
使用の際には、よくお読みください。

Santen

コンタクト装着時の不快感・目の疲れに 第3類医薬品

サンテPC® コンタクト 目薬

ブルーライト等による光ダメージをケア [目薬]

スマホやPCの画面から出ている青色光＝いわゆるブルーライトなどにより、目には負担がかかっています。「サンテPC コンタクト」は、このブルーライトなどによる目の炎症や目の疲れをケアする目薬。コンタクトレンズをしたまま使うことができます。ダメージを受けた目の組織代謝を促進するビタミンB6に加え、スマホやPCで疲れた目のピント調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩、長時間のコンタクトで傷ついた角膜の修復を促すフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム(活性型ビタミンB2)を最大濃度配合※。さらに、イプシロン-アミノカプロン酸が目の炎症を抑えます。スマホやPCを長時間見つめることの多い、コンタクトユーザーの目の疲れに効果を発揮する目薬です。

※ 一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大濃度

カラーコンタクトレンズをのぞくすべてのコンタクトレンズ装着中に使えます。

ソフト

O₂

ハード

使い捨て
(ディスポザブル)

コンタクトレンズを装着していない方もご使用いただけます。

※ソフトコンタクトレンズを装着したままでは使用できない目薬もありますので、
外箱や添付文書をよく確認しましょう。

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- [1] 医師の治療を受けている人
- [2] 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- [3] 次の症状のある人
はげしい目の痛み
- [4] 次の診断を受けた人
緑内障

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、
直ちに使用を中止し、この文書を持って
医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、
この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。

- [1] 目のかすみ改善されない場合
- [2] 2週間くらい使用しても症状がよならない場合

用法・用量

1回1～3滴、1日5～6回点眼してください。

● 次の注意事項をお守りください。

- [1] 小児に使用させる場合には、
保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- [2] 容器の先を、目やまぶた、まつ毛に触れさせないでください
(目やにや雑菌などの混入のため、薬液が汚染または混濁する
ことがあります)。
また、混濁したものは使用しないでください。
- [3] 点眼用にのみ使用してください。
- [4] カラーコンタクトレンズの装着時は使用しないでください。



裏面につづく

ツイストキャップの開封方法

必ずキャップを上にしてあけてください。

注：容器の中心を押さえたまま開封すると薬液がとびだすことがあります。



【あけ方】
キャップを
手前に
ひねります。



【しめ方】
とまるまで
しっかりと
押し下げます。

効能・効果

紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、目の疲れ、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、ソフトコンタクトレンズまたはハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感


成分・分量

成 分	分 量	はたらき
ビタミンB6 (ピリドキシン塩酸塩)	0.1%	目の組織代謝を活発にします。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005%	ピント調節機能改善作用により、目の疲れなどを改善します。
フラビンアデニン ジヌクレオチドナトリウム (活性型ビタミンB2)	0.05%	角膜などの組織代謝を促進し、修復を促します。
イプシロン-アミノカプロン酸	1.0%	炎症の原因となる物質の産生を抑えます。

添加物として、エデト酸ナトリウム水和物、ソルビン酸、デキストラン、ヒアルロン酸ナトリウム、ヒドロキシエチルセルロース、ホウ酸、ホウ砂、等張化剤、pH調節剤を含有します。

保管および取扱い上の注意

- [1] 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。製品の品質を保持するため、自動車の中や暖房器具の近くなど高温となる場所に放置しないでください。また、高温となる場所に放置したものは、容器が変形して薬液が漏れたり薬液の品質が劣化しているおそれがありますので、使用しないでください。
- [2] 小児の手の届かない所に保管してください。
- [3] 他の容器に入れ替えないでください。
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- [4] 他の人と共用しないでください。
- [5] 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開栓後は約3ヶ月を目安に使用してください。
- [6] 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の点眼口周囲やキャップの内側に黄色くつくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取って使用してください。
- [7] 本剤の黄色はフラビンアデニンジヌクレオチドナトリウム（活性型ビタミンB2）の色です。点眼中に薬液がこぼれてシャツなどが着色した場合は、すぐに水洗いしてください。



包 装 12mL

お問い合わせ先

商品の内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

参天製薬株式会社「お客様相談室」 電話番号 0120-127-023

受付時間 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）

お問い合わせ内容の正確性を期すため、また回答の質の維持・向上のため、お電話を録音させていただいております。