

第2類医薬品

メソッド

メソッド CLローション

保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温および極端な低温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して立てて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり品質が変わります。）。
- (4) 火気近づけないでください。
- (5) 本剤はアルコール類を含むため、メガネ、アクセサリー類、時計、履具、プラスチック製品、化粧品、皮革製品、床、家具などにつかないように注意してください（変質する場合があります。）。
- (6) 使用期限（箱底面に記載）を過ぎた製品は使用しないでください。
- (7) 液もれを防ぐためキャップをしっかり閉めてください。
- (8) 染めた髪につくと色落ちすることがあります。
- (9) 使用後はボトルの口元を拭いてください。

火気厳禁 第二石油類(エタノール)
水溶性 危険等級Ⅲ

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

（お問合せ先）電話：0120-813-752

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

副作用報告救済制度 電話：0120-149-931

Antipruritic
And Anti-inflammatory
Drugs



ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

かゆい「部位」に効く 頭皮などのかゆみ・湿疹に
メソッド CLローション 50mL

<鎮痒消炎薬>

＜こんな症状に・こんな方に＞



メソッド CLローションの特長 4つの作用で、かゆみ・湿疹に「効く」治療薬

かゆみをすばやく止める ・ジフェニヒドラミン ・リドカイン ・l-メントール	炎症を鎮め、赤みやアプツツを抑える ・グリチルリチン酸二カリウム	患部を殺菌する ・イソプロピルメチルフェニール	血行を促進し、患部の修復を助ける ・トコフェロール酢酸エステル
--	--	-----------------------------------	---

●スプレーと爽快感 ●垂れにくく、べたつかない透明ローション ●無香料、無着色

効能 かゆみ、湿疹、皮膚炎、かぶれ、あせも、ただれ、虫さされ、じんましん、しもやけ 0320
用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関連する注意>



頭皮に使用する場合は、症状のある部分に、右図のように髪の流れに沿って塗布した後、指でなじませてください。



(1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。(2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(3) 外用にのみ使用してください。

成分(1g中) ジェンヒドラン10mg、リドカイン20mg、l-メントール5mg、グリチルリチン酸二カリウム10mg、イソプロピルメチルフェニール1mg、トコフェロール酢酸エステル5mg 添加物：グリセリン、1,3-ブチレングリコール、セチル硫酸Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、エデト酸Na、エタノール、パラベン、その他2成分

使用上の注意
相対するべきこと 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください (1) 医師の治療を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3) 湿漏やただれのひどい人。
 2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

非ステロイド

爽快クール

頭皮などの かゆみ・ 湿疹に

ヘア剤や汗・乾燥によるかゆみ



皮膚治療薬 50mL
第2類医薬品